KITAZATO®

Copyright © KITAZATO CORPORATION
All Rights Reserved.
V13 2024-04

CE 2797

ET CATHETERS

Kitazato Corporation
100-10 Yanagishima, Fuji,
Shizuoka 416-0932 Japan
TEL: +81-545-65-7122 · FAX: +81-545-65-7128

EC REP **Dibimed - Biomedical Supply, S.L.**
C/Jorge Comin, 3, Valencia, 46015, Spain
Tel (+34) 963 056 395 Fax (+34) 963 056 396

UK REP

	EN	DE	FR	ES	IT	NL	PT	PL	EL	SV	DA	NO	FI	CS	SK	HU	RO	BG	SL	HR	SR	TR	UA
Keep away from sunlight	Keep away from sunlight	Vor Sonneneinstrahlung schützen	Protéger des rayons du soleil	Mantener alejado de la luz solar	Tenere lontano dalla luce del sole	Niet in direct zonlicht bewaren	Manter afastado da luz solar	Chronić przed światłem słonecznym	Διατηρείτε μακριά από το ηλιακό φως	Förvaras oåtkomligt för solljus	Opbevares ikke i direkte sollys	Oppbevares ikke i direkte sollys	Säilytä suojassa auringonvalolta	Chraňte před slunečním zářením	Chráňte pred slnečným svetlom	Napon maksimalno dopušteni	Napon maksimalno dopušteni	Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi	Ne izlažite neposrednoj sunčevoj svjetlosti	Ne izlažite neposrednoj sunčevoj svjetlosti	Güneş ışığından uzak tutun	Зберігати подалі від сонячних променів
Use by date	Use by date	Verfallsdatum	Date limite d'utilisation	Fecha límite de uso	Data limite di utilizzo	Uiterste gebruiksdatum	Data limite de utilização	Data ważności	Ημερομηνία λήξης	Sista förbrukningsdag	Sidste brugsdato	Siste forbruksdato	Viimeinen käyttöajankohta	Datum spotřeby	Dátum spotreby	Felhasználási határidő	Data de expirare	Използвайте до	Uporabno do	Upotrijebiti do	Употребити до	Son Kullanma Tarihi	Дата придатності
Do not use if package is damaged	Do not use if package is damaged	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé	No utilizar si el envase está dañado	Non utilizzare se la confezione è danneggiata	Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is	Não utilizar se a embalagem estiver danificada	Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone	Μη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη	Använd inte om förpackningen är skadad	Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget	Skal ikke brukes hvis emballasjen er skadet	Ei saa käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut	Nepoužívejte, je-li obal poškozen	Nepoužívajte, ak je obal poškodený	Ne használja, ha a csomagolás sérült	Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat	Не използвайте, ако опаковката е повредена	Ne uporabite, če je embalaža poškodovana	Ne koristiti ako je pakiranje oštećeno	Ne koristiti ako je ambalaj hasarlı	Не використовувати, якщо упаковка пошкоджена
Sterile barrier system with protective packaging outside	Sterile barrier system with protective packaging outside	Sterilbarrieresystem mit Schutzverpackung außen	Système de barrière stérile avec emballage protecteur à l'extérieur	Sistema de barrera estéril con embalaje protector en el exterior	Sistema a barriera sterile con imballaggio protettivo all'esterno	Steriel barrièresysteem met beschermende verpakking aan de buitenkant	Sistema de barreira estéril com embalagem protetora no exterior	System bariery sterylnej z ochronnym opakowaniem na zewnątrz	Σύστημα αποστειρωμένου φραγμού με προστατευτική συσκευασία στο εξωτερικό	Sterilt barriärsystem med skyddande förpackning på utsidan	Sterilt barrieresystem med beskyttende forpakning på ydersiden	Sterilt barrieresystem med beskyttende emballasje på utsiden	Steriili esteen suojapakkaus ulkopuolella	Sterilní bariérový systém s ochranným obalem	Sterilný bariérový systém s ochranným obalom	Steril gátrendszer védőcsomagolással kívül	Sistem de barieră sterilă cu ambalaj protector la exterior	Стерилна бариерна система с защитна опаковка отвън	Sterilni pregradni sistem z zaščitno embalažo zunaj	Sterilni barijerni sustav sa zaštitnim pakiranjem izvana	Sterilna barijerna zaštitna ambalaža	Стерильна бар'єрна система із захисною упаковкою ззовні
Do not re-use	Do not re-use	Nicht wiederverwenden	Ne pas réutiliser	No reutilizar	Non riutilizzare	Niet opnieuw gebruiken	Não reutilizar	Nie używać ponownie	Μη επαναχρησιμοποιείτε	Får ej återanvändas	Må ikke genbruges	Skal ikke brukes på nytt	Ei saa käyttää uudelleen	Nepoužívejte znovu	Nepoužívajte znova	Nem használható fel újra	A nu se refolosi	Не използвайте повторно	Ne uporabljati ponovno	Ne koristiti ponovno	Tekrar kullanmayın	Не використовувати повторно
Do not resterilize	Do not resterilize	Nicht resterilisieren	Ne pas restériliser	No reesterilizar	Non risterilizzare	Niet opnieuw steriliseren	Não reesterilizar	Nie sterylizować ponownie	Μην επαναποστειρώνετε	Får ej omsteriliseras	Må ikke resteriliseres	Skal ikke resteriliseres	Ei saa steriloida uudelleen	Neresterilizujte	Nesterilizujte	Ne sterilizálja újra	A nu se resteriliza	Не стерилизирайте повторно	Ne sterilizirajte ponovno	Ne sterilizirati ponovno	Yeniden sterilize etmeyin	Не стерилізувати повторно
Keep dry	Keep dry	Trocken halten	Tenir au sec	Mantener seco	Tenere asciutto	Droog houden	Manter seco	Chronić przed wilgocią	Διατηρείτε στεγνό	Förvaras torrt	Opbevares tørt	Oppbevares tørt	Säilytä kuivassa	Uchovávejte v suchu	Uchovávajte v suchu	Szárazon tartandó	A se păstra uscat	Да се пази сухо	Hraniti na suhem	Čuvati na suvom	Kuru tutun	Зберігати сухим
Consult instructions for use	Consult instructions for use	Gebrauchsanweisung beachten	Consulter le mode d'emploi	Consultar las instrucciones de uso	Consultare le istruzioni per l'uso	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing	Consultar as instruções de utilização	Zapoznać się z instrukcją użycia	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης	Läs bruksanvisningen	Se brugsanvisningen	Se bruksanvisningen	Katso käyttöohjeet	Viz návod k použití	Pozrite si návod na použitie	Lásd használati útmutató	Consultați instrucțiunile de utilizare	Вижте инструкциите за употреба	Glejte navodila za uporabo	Pogledajte upute za uporabu	Pogledajte uputstvo za upotrebu	Kullanım talimatlarına bakın	Ознайомтеся з інструкцією з використання
Single sterile barrier system with protective packaging outside	Single sterile barrier system with protective packaging outside	Einfaches Sterilbarrieresystem mit Schutzverpackung außen	Système de barrière stérile simple avec emballage protecteur à l'extérieur	Sistema de barrera estéril simple con embalaje protector en el exterior	Sistema a barriera sterile singola con imballaggio protettivo all'esterno	Enkelvoudig steriel barrièresysteem met beschermende verpakking aan de buitenkant	Sistema de barreira estéril simples com embalagem protetora no exterior	System pojedynczej bariery sterylnej z ochronnym opakowaniem na zewnątrz	Σύστημα απλού αποστειρωμένου φραγμού με προστατευτική συσκευασία στο εξωτερικό	Enkelt sterilt barriärsystem med skyddande förpackning på utsidan	Enkelt sterilt barrieresystem med beskyttende forpakning på ydersiden	Enkelt sterilt barrieresystem med beskyttende emballasje på utsiden	Yksinkertainen steriili esteen suojapakkaus ulkopuolella	Jednoduchý sterilní bariérový systém s ochranným obalem	Jednoduchý sterilný bariérový systém s ochranným obalom	Egyszeri sterilgát védőcsomagolással kívül	Sistem simplu de barieră sterilă cu ambalaj protector la exterior	Единична стерилна бариерна система с защитна опаковка отвън	Enojni sterilni pregradni sistem z zaščitno embalažo zunaj	Jednostruki sterilni barijerni sustav sa zaštitnim pakiranjem izvana	Jednostruki sterilni barijerni zaštitni sistem	Tek katmanlı sterilite bariyer sistemi ve dış koruyucu ambalaj	Одинарна стерильна бар'єрна система із захисною упаковкою ззовні
Do not use if package is damaged	Do not use if package is damaged	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé	No utilizar si el envase está dañado	Non utilizzare se la confezione è danneggiata	Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is	Não utilizar se a embalagem estiver danificada	Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone	Μη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη	Använd inte om förpackningen är skadad	Må ikke anvendes, hvis pakken er åbnet eller beskadiget	Skal ikke brukes hvis emballasjen er skadet	Ei saa käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut	Nepoužívejte, je-li obal poškozen	Nepoužívajte, ak je obal poškodený	Ne használja, ha a csomagolás sérült	Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat	Не използвайте, ако опаковката е отворена или повредена	Ne uporabite, če je embalaža poškodovana	Ne koristiti ako je pakiranje oštećeno	Ne kullanmayın, ambalaj hasarlıysa	Не використовувати, якщо упаковка пошкоджена

EN- ET CATHETERS

GENERAL INFORMATION Basic UDI-DI: 458223146ET-CHW Read the instructions for use before use Target population: Patients undergoing ART procedures For professional use only **INTENDED USE** The Kitazato ET catheter is intended for ultrasound guided introduction of embryos into the uterine cavity following in vitro fertilization **INSTRUCTIONS FOR USE** 1. Place the patient in the lithotomy position. Insert vaginal speculum to expose cervix. Check the condition of the cervix and the endometrium, and decide the insertion length and the angle of the catheter and the guide before use. **Caution:** Use a stylet guide if the cervix bends and seems difficult to pass. 2. Wash the vulva and the vagina with sterilized saline solution and dry them. 3. Connect a syringe to the connector of the catheter and aspirate embryo into the catheter under microscope. 4. Insert the catheter up to the cervix. **Caution:** Use a guide or a stylet guide as assistance when the catheter does not go through the cervix by itself. 5. Check the catheter reached the uterus under ultrasound. Slowly press the plunger of the syringe and expel the embryo into the uterine cavity. 6. Carefully remove the catheter. 7. Check for retention of embryos. 8. Take the vaginal speculum out and keep the patient at rest. **CAUTION: Bleeding may occur as a result of trauma due to insertion of the catheter through the cervix.** **PRODUCT SPECIFICATIONS** • Sterility: SAL 10-6 • LAL assay (Endotoxins): < 20 EU/device • MEA (1-cell, % blastocysts after 96h): ≥ 80% MSDS and Certificate of Analysis are available upon request or can be downloaded from our website (kitazato-ivf.com) **STORAGE INTRUCTIONS** • Store away from high temperature and high humidity. • Use immediately after opening. **WARNİNGS** • To avoid infection, do not re-use. • Do not re-sterilize, to avoid deterioration. • Do not use the product after expiration date. • Do not use if the package is opened or damaged. • This product is intended to be used by medical specialists trained in fertility treatment. • Aseptic technique should be used. • Observe all federal, state and local environmental regulations when discarding the product. • The user shall be responsible for any problems caused by incorrect use of the present IFU. **PRECAUTIONS** • Confirm the specification (gauge and length) of the catheter before opening the pouch. • Confirm adaptability with the other medical equipment to use together beforehand. • Do not wash the inside of the catheter with sterilized saline solution before infusing the catheter. It may cause aspiration problems. • Do not jack up forcedly or reprocess. • Discard immediately after use. Any serious incident (as defined in European Medical Device Regulation, 2017/745) that has occurred in relation to the device should be reported to Kitazato Corporation and, if applicable, the competent authority of the EU Member State in which the user and/or patient is established. **Note:** Instructions for use are electronically available at Kitazato-ivf.com or upon request.

BG- ET CATHETERS

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Основен UDI-DI: 458223146ETCHW Прочетете инструкциите за употреба преди употреба Целева група: Пациенти, подложени на АРТ процедури Само за професионална употреба **ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА** Катетърът Kitazato ET е предназначен за ултразвуково направляване въвеждане на ембриони в маточната кухина след ин витро оплождане **ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА** 1. Поставете пациента в позиция литотомия. Поставете вагинален спекулум, за да достъпите шийката на матката. Проверете състоянието на шийката на матката и ендометриума и решете дължината на вмъкване и ъгъла на катетъра и водача преди употреба. **Внимание:** Използвайте стилет водач, ако шийката на матката се огъне и изглежда трудна за преминаване. 2. Измийте вулвата и влагалището със стерилизиран физиологичен разтвор и ги подсушете. 3. Свържете спринцовка към конектора на катетъра и аспирирайте ембрион или гамета в катетъра под микроскоп. 4. Въведете катетъра в шийката на матката. **Внимание:** Използвайте водач или стилет водач като помощ, когато катетърът не преминава през шийката на матката сам по себе си. 5. Проверете дали катетъра е достигнал до матката под ултразвук. Бавно натиснете буталото на спринцовката и поставете ембриона или гаметата в маточната кухина. 6. Внимателно отстранете катетъра. 7. Проверете за останали в катетъра ембриони. 8. Извадете вагиналния спекулум и дръжте пациента в покой. **ВНИМАНИЕ: Кървене може да възникне в резултат на травма поради поставяне на катетъра през шийката на матката. СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА** • Стерилитет: SAL 10-6 • LAL анализ (ендотоксини): < 20 EU/устройство • MEA (1-клетъчни, % бластоцисти след 96 часа): ≥ 80% MSDS и сертификатът за анализ са на разположение при поискване или могат да бъдат изтеглени от нашия уебсайт (kitazato-ivf.com) **ИНТРУКЦИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ** • Съхранявайте далеч от висока температура и висока влажност. • Използвайте незабавно след отваряне. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ** • За да избегнете инфекция, не използвайте повторно. • Не стерилизирайте повторно, за да избегнете влошаване. • Не използвайте продукта след изтичане на срока на годност. • Не използвайте, ако опаковката е отворена или повредена. • Този продукт е предназначен за употреба от медицински специалисти, обучени в лечението на плодовитостта. • Трябва да се използва асептична техника. • Спазвайте всички федерални, щатски и местни екологични разпоредби, когато изхвърляте продукта. • Потребителят носи отговорност за всички проблеми, причинени от неправилното използване на настоящата инструкция за употреба. **ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ** • Потвърдете спецификацията (габарит и дължина) на катетъра, преди да отворите торбичката • Потвърдете адаптивността с другото медицинско оборудване, което да използвате заедно предварително. • Не измивайте вътрешността на катетъра със стерилизиран физиологичен разтвор преди вливане на катетъра. Това може да причини проблеми с аспирацията. • Не вдигайте насила и не преработвайте повторно. • Изхвърлете веднага след употреба. Всеки сериозен инцидент (както е определен в Европейския регламент за медицинските изделия, 2017/745), който е възникнал във връзка с изделието, трябва да бъде докладван на Kitazato Corporation и, ако е приложимо, на компетентния орган на държавата членка на ЕС, в която е установен потребителят и/или пациентът. **Забележка:** Инструкциите за употреба са достъпни по електронен път на Kitazato-ivf.com или при поискване.

CZ- ET CATHETERS

OBECNÉ INFORMACE Základní UDI-DI: 458223146ET-CHW Před použitím si přečtěte návod k použití Cílová skupina: Pacienti podstupující procedury ART Pouze pro profesionální použití **ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ** Katétr Kitazato ET je určen k zavádění embryí do dělicí dutiny po in vitro fertilizaci. **NÁVOD K POUŽITÍ** 1. Umístěte pacienta do litotomické polohy. Vložte vaginální zrcátko, za účelem odhalení děložního čípku. Před použitím zkontrolujte stav děložního čípku a endometria a rozhodněte o délce zavedení a úhlu katétru a styletu. **Upozornění:** Pokud se děložní čípek ohne a zdá se, že je obtížné jím projít, použijte stylet. 2. Omyjte vulvu a pochvu sterilizovaným fyziologickým roztokem a osušte je. 3. Připojte injekční stříkačku ke konektoru katétru a nasajte embryo do katétru pod mikroskopem. 4. Zaveďte katétr až do děložního čípku. **Upozornění:** Pokud katétr sám neprochází děložním čípkem, použijte obturátor nebo stylet jako pomůcku. 5. Zkontrolujte, zda se katétr dostal do dělohy pod ultrazvukem. Pomalu stiskněte píst injekční stříkačky a vložte embryo do děložní dutiny. 6. Opatrně vyjměte katétr. 7. Zkontrolujte retenci embryí. 8. Vyjměte vaginální zrcátko a udržujte pacientku v klidu. **POZOR: V důsledku traumatu způsobeného vsunutím katetru do děložního čípku může dojít ke krvácení. Netlačte silně na katetr.** **SPECIFIKACE** • Sterilita: SAL 10-6 • Test LAL (endotoxiny): < 20 EU/zařízení • MEA (1bunečné, % blastocyst po 96 hodinách): ≥ 80 % Bezpečnostní list a analytický certifikát jsou k dispozici na vyžádání nebo si je můžete stáhnout z našich webových stránek (kitazato-ivf.com) **POKYNY K UKLÁDÁNÍ** • Skladujte mimo dosah vysokých teplot a vysoké vlhkosti. • Spotřebujte ihned po otevření obalu. **VAROVÁNÍ** • Abyste předešli infekci, nepoužívejte produkt opakovaně. • Nesterilizujte opakovaně, aby nedošlo k poškození produktu • Nepoužívejte výrobek po uplynutí doby exspirace • Nepoužívejte, pokud je obal otevřený nebo poškozený. • Tento produkt je určen k použití lékařskými specialisty vyškolenými v léčbě neplodnosti. • Měla by být použita aseptická technika. • Při likvidaci produktu dodržujte všechny federální, státní a místní předpisy na ochranu životního prostředí. • Uživatel nese odpovědnost za jakékoli problémy způsobené nesprávným použitím tohoto návodu. **OPATŘENÍ** • Před otevřením obalu potvrďte specifikaci (měřidlo a délku) katétru • Předem si ověřte kompatibilitu s ostatním lékařským vybavením, které chcete používat společně. • Před infuzí katétru neomývejte vnitřek katétru sterilizovaným fyziologickým roztokem. Může způsobit problémy s aspirací. • Nezvedejte násilím ani produkt nepřepracovávejte • Ihned po použití zlikvidujte. Jakýkoli závažný incident (jak je definován v evropském nařízení o zdravotnických prostředcích, 2017/745), ke kterému došlo v souvislosti se zařízením, by měl být nahlášen společnosti Kitazato Corporation a případně příslušnému orgánu členského státu EU, ve kterém je uživatel a/nebo pacient usazen. **Poznámka:** Návod k použití je k dispozici v elektronické podobě na Kitazato-ivf.com nebo na vyžádání.

DE- ET CATHETERS

ALLGEMEINE INFORMATIONEN Basis-UDI-DI: 458223146ETCHW Lesen Sie vor Gebrauch die Gebrauchsanweisung Zielgruppe: Patienten, die sich einer ART-Behandlung unterziehen Nur für den professionellen Gebrauch **BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG** Der Katheter Kitazato ET ist für die ultraschallgesteuerte Einführung von Embryonen in die Gebärmutterhöhle nach einer In-vitro-Fertilisation bestimmt **GEBRAUCHSANWEISUNG** 1. Bringen Sie den Patienten in die Steinschnittposition. Führen Sie Vaginalspekulum ein, um den Gebärmutterhals freizulegen. Überprüfen Sie den Zustand des Gebärmutterhalses und der Gebärmutterschleimhaut und entscheiden Sie vor der Anwendung über die Einführlänge und den Winkel des Katheters und der Führung. **Achtung:** Verwenden Sie eine Stilettführung, wenn sich der Gebärmutterhals biegt und schwer zu passieren scheint. 2. Waschen Sie die Vulva und die Vagina mit sterilisierter Kochsalzlösung und trocknen Sie sie ab. 3. Schließen Sie eine Spritze an den Anschluss des Katheters an und saugen Sie den Embryo unter dem Mikroskop in den Katheter ein. 4. Führen Sie den Katheter bis zum Gebärmutterhals ein. **Achtung:** Verwenden Sie eine Führung oder eine Stilettführung als Hilfestellung, wenn der Katheter nicht von selbst durch den Gebärmutterhals führt. 5. Überprüfen Sie, ob der Katheter die Gebärmutter unter Ultraschall erreicht hat. Drücken Sie langsam auf den Kolben der Spritze und stoßen Sie den Embryo in die Gebärmutterhöhle aus. 6. Entfernen Sie den Katheter vorsichtig. 7. Prüfen Sie, ob die Embryonen zurückgehalten werden. 8. Nehmen Sie das Vaginalspekulum heraus und lassen Sie die Patientin ruhen. **VORSICHT: Blutungen können als Folge eines Traumas durch das Einführen des Katheters durch den Gebärmutterhals auftreten.** **PRODUKTSPEZIFIKATIONEN** • Sterilität: SAL 10-6 • LAL-Assay (Endotoxine): < 20 EU/Gerät • MEA (1 Zelle, % Blastozysten nach 96 Stunden): ≥ 80 % Sicherheitsdatenblätter und Analysezertifikate sind auf Anfrage erhältlich oder können von unserer Website heruntergeladen werden (kitazato-ivf.com) **AUFBEWAHRUNGSANWEISUNGEN** • Vor hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit geschützt lagern. • Nach dem Öffnen sofort verbrauchen. **WARNUNGEN** • Um Infektionen zu vermeiden, nicht wiederverwenden. • Nicht erneut sterilisieren, um eine Verschlechterung zu vermeiden. • Verwenden Sie das Produkt nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr. • Nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist. • Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachärzte bestimmt, die in der Fruchtbarkeitsbehandlung ausgebildet sind. • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Beachten Sie alle Bundes-, Landes- und lokalen Umweltvorschriften, wenn Sie das Produkt entsorgen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. **VORSICHTSMAßNAHMEN** • Bestätigen Sie die Spezifikation (Stärke und Länge) des Katheters, bevor Sie den Beutel öffnen • Vergewissern Sie sich vorher über die Anpassungsfähigkeit mit den anderen medizinischen Geräten, die zusammen verwendet werden sollen. • Waschen Sie die Innenseite des Katheters nicht mit sterilisierter Kochsalzlösung, bevor Sie den Katheter infundieren. Es kann zu Aspirationsproblemen kommen. • Nicht gewaltsam aufbocken oder aufbereiten. • Sofort nach Gebrauch entsorgen. Jedes schwerwiegende Vorkommnis (im Sinne der europäischen Medizinprodukteverordnung 2017/745), das im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, sollte der Kitazato Corporation und gegebenenfalls der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden. **Hinweis:** Die Gebrauchsanweisung ist auf Kitazato-ivf.com oder auf Anfrage elektronisch erhältlich.

DK- ET CATHETERS

GENEREL INFORMATION Grundlæggende UDI-DI: 458223146ETCHW Læs brugsanvisningen før brug Målgruppe: Patienter, der gennemgår ART-procedurer Kun til professionel brug **TILSIGTET ANVENDELSE** Kitazato ET-kateteret er beregnet til ultralyds guideid indsættelse af embryoner i livmoderhulen efter in vitro-befrugtning **BRUGERVEJLEDNING** 1. Placer patienten i lithotomiposition. Indsæt vaginal spekulum for at synliggøre livmoderhalsen. Kontroller tilstanden af livmoderhalsen og endometrium, og bestem indsættelseslængde og vinklen for kateter og guide før brug. **Forsigtig:** Brug en stylet guide, hvis livmoderhalsen bøjer og er vanskelig at passere. 2. Vask vulva og vagina med en steriliseret saltopløsning og tør dem. 3. Tilslut en sprøjte til kateterets og aspirer embryoet ind i kateteret under et mikroskop. 4. Indfør kateteret op til livmoderhalsen. **Forsigtig:** Brug en guide eller en stylet guide som hjælp, hvis kateteret ikke passerer livmoderhalsen af sig selv. 5. Kontroller, ved hjælp af ultralyd, at kateteret er placeret i livmoderen. Tryk langsomt på sprøjtens stempel for at indsætte embryonet i livmoderhulen. 6. Fjern forsigtigt kateteret. 7. Kontroller, at embryoner er indsat. 8. Fjern spekulum og hold patienten i ro. **OBS: Blødning kan forekomme som følge af traumer forårsaget af indsættelse af kateteret gennem livmoderhalsen.** **PRODUKT SPECIFIKATIONER** • Sterilitet: SAL 10-6 • LAL-assay (endotoksiner): < 20 EU/enhed • MEA (1-cellede, % blastocyster efter 96 timer): ≥ 80% MSDS og analysecertifikat er tilgængelige efter anmodning eller kan downloades fra vores websted (kitazato-ivf.com) **OPBEVARING** • Opbevares væk fra høj temperatur og høj luftfugtighed. • Brug straks efter åbning. **ADVARSLER** • For at undgå infektion, må ikke genbruges. • Steriliser ikke igen for at undgå forringelse af produktet. • Brug ikke produktet efter udløbsdatoen. • Må ikke anvendes, hvis pakken er åbnet eller beskadiget. • Dette produkt er beregnet til at blive brugt af medicinske specialister, der er uddannet i fertilitetsbehandling. • Der bør anvendes aseptisk teknik. • Overhold alle føderale, statslige og lokale miljøbestemmelser, når du kasserer produktet. • Brugeren er ansvarlig for eventuelle problemer, der skyldes forkert brug af denne vejledning. **FORHOLDSREGLER** • Verificer kateterets specifikation (diameter og længde), inden posen åbnes. • Verificer på forhånd at ET kateteret er kompatibel med andet medicinske udstyr den skal bruges sammen med. • Vask ikke indersiden af kateteret med steriliseret saltopløsning, før kateteret indsættes. Det kan forårsage aspirationsproblemer. • Indsæt ikke kateteret med kraft og gentag ikke processen med samme kateter. • Kassér produktet straks efter brug Enhver alvorlig hændelse (som defineret i den europæiske forordning om medicinsk udstyr, 2017/745), der er indtruffet i forbindelse med udstyret, skal indberettes til Kitazato Corporation og, hvis det er relevant, den kompetente myndighed i den EU-medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er etableret. **Bemærk:** Brugsanvisninger er elektronisk tilgængelige på Kitazato-ivf.com eller efter anmodning.

EE- ET CATHETERS

ÜLDINE TEAVE Põhiline UDI-DI: 458223146ETCHW Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit Sihtrühm: ART-protseduure läbivad patsiendid Ainult professionaalseks kasutamiseks **KAVANDATUD KASUTUS** Kitazato ET kateeter on ette nähtud embrüote ultraheliga juhitavaks sisseviimiseks emakaõõnde pärast in vitro viljastamist **KASUTUSJUHEND** 1. Asetage patsient litotoomia asendisse. Emakakaela paljastamiseks sisestage vaginaalne spekulatsioon. Kontrollige emakakaela ja endomeetriumi seisundit ning otsustage enne kasutamist sisestamise pikkus ja kateetri ja juhiku nurk. **Ettevaatust:** Kasutage stiiljuhendit, kui emakakael paindub ja tundub raskesti läbitav. 2. Peske vulva ja tupe steriliseeritud soolalahusega ja kuivatage. 3. Ühendage süstal kateetri pistikuga ja aspireerige embrüo mikroskoobi all kateetrisse. 4. Sisestage kateeter emakakaelani. **Ettevaatust:** Kasutage abivahendina juhendit või stiiljuhendit, kui kateeter ei läbi emakakaela iseenesest. 5. Kontrollige, kas kateeter jõudis ultraheliga emakasse. Vajutage aeglaselt süstla kolbi ja väljutage embrüo emakaõõnde 6. Eemaldage kateeter ettevaatlikult. 7. Kontrollige embrüote säilitamist. 8. Võtke vaginaalne spekulatsioon välja ja hoidke patsienti puhkeasendis. **ETTEVAATUST: Verejooks võib tekkida trauma tagajärjel, mis on tingitud kateetri sisestamisest läbi emakakaela.** **TOOTE SPETSIFIKATSIOONID** • Steriilsus: SAL 10-6 • LAL test (endotoksiinid): < 20 EL/seade • MEA (1-rakuline, % blastotsüstidest pärast 96 tundi): ≥ 80% MSDS ja analüüsisertifikaat on saadaval nõudmisel või neid saab alla laadida meie veebisaidilt (kitazato-ivf.com) **LADUSTAMISE SISSETUNGID** • Hoida eemal kõrgest temperatuurist ja kõrgest õhuniikusest. • Kasutage kohe pärast avamist. **HOIATUSED** • Infektsiooni vältimiseks ärge kasutage uuesti. • Ärge steriliseerige uuesti, et vältida halvenemist. • Ärge kasutage toodet pärast kõlblikkusaega. • Ärge kasutage, kui pakend on avatud või kahjustatud. • See toode on ette nähtud kasutamiseks viljatusravi alal koolitatud meditsiinitöötajatele. • Kasutada tuleks aseptilist tehnikat. • Toote äraviksamisel järgige kõiki föderaalseid, osariigi ja kohalikke keskkonnaeeskirju. • Kasutaja vastutab kõigi käesoleva IFU ebaõigest kasutamisest tingitud probleemide eest. **ETTEVAATUSABINÕUD** • Enne koti avamist kinnitage kateetri spetsifikatsioon (gabariit ja pikkus) • Kinnitage kohanemisvõime teiste meditsiiniseadmetega, mida eelnevalt koos kasutada. • Ärge peske kateetri sisemust steriliseeritud soolalahusega enne kateetri infundeerimist. See võib põhjustada aspiratsiooniprobleeme. • Ärge tungrauaga jõuga üles tõstke ega töödelge ümber. • Visake kohe pärast kasutamist ära. Igast seadmega seotud tõsisest vahejuhtumist (nagu on määratletud Euroopa meditsiiniseadmete määruses (EL) 2017/745) tuleks teatada Kitazato Corporationile ja vajaduse korral selle ELi liikmesriigi pädevale asutusele, kus kasutaja ja/või patsient asub. **Märkus:** Kasutusjuhend on elektrooniliselt kättesaadav Kitazato-ivf.com või soovi korral.

ES- ET CATHETERS

INFORMACIÓN GENERAL UDI-DI básico: 458223146ETCHW Lea las instrucciones de uso antes de usar Población objetivo: Pacientes sometidos a procedimientos de reproducción asistida Solo para uso profesional **USO PREVISTO** El catéter de transferencia embrionaria de Kitazato se utiliza para colocar los embriones en la cavidad uterina a través del cuello uterino siguiendo la fecundación in vitro. **INSTRUCCIONES DE USO** 1. Coloque al paciente en posición de litotomía. Inserte un espéculo vaginal para exponer el cuello uterino. Compruebe el estado del cuello uterino y el endometrio, y decida la longitud de inserción y el ángulo del catéter y la guía antes de su uso. **Precaución:** Use una guía de estilete si el cuello uterino se dobla y parece difícil de pasar. 2. Lave y seque la vulva y la vagina con suero fisiológico esterilizado. 3. Conecte una jeringa al conector del catéter y aspire el embrión hacia el catéter bajo el microscopio. 4. Inserte el catéter hasta el cuello uterino. **Precaución:** Utilice una guía o una guía de estilete como ayuda cuando el catéter no atraviese el cuello uterino por sí solo. 5. Verifique que el catéter llegó al útero mediante una ecografía. Presione lentamente el émbolo de la jeringa y expulse el embrión hacia la cavidad uterina. 6. Retire con cuidado el catéter. 7. Compruebe que no hay retención de embriones en el catéter bajo el microscopio. 8. Saque el espéculo vaginal y mantenga a la paciente en reposo. **PRECAUCIÓN: El sangrado puede ocurrir como resultado de un traumatismo debido a la inserción del catéter a través del cuello uterino.** **ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO** • Esterilidad: SAL 10-6 • Ensayo LAL (endotoxinas): < 20 UE/dispositivo • MEA (1 célula, % blastocistos después de 96 h): ≥ 80% La MSDS y el Certificado de Análisis están disponibles a pedido o se pueden descargar de nuestro sitio web (kitazato-ivf.com) **INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO** • Almacenar lejos de altas temperaturas y alta humedad. • Úselo inmediatamente después de abrirlo. **ADVERTENCIAS** • Para evitar infecciones, no lo reutilice. • No volver a esterilizar, para evitar el deterioro. • No utilice el producto después de la fecha de vencimiento. • No lo use si el paquete está abierto o dañado. • Este producto está destinado a ser utilizado por médicos especialistas capacitados en tratamientos de fertilidad. • Se debe utilizar la técnica aséptica. • Observe todas las regulaciones ambientales federales, estatales y locales cuando deseche el producto. • El usuario será responsable de cualquier problema causado por el uso incorrecto de las presentes instrucciones de uso. **PRECAUCIONES** • Confirme las especificaciones (calibre y longitud) del catéter antes de abrir la bolsa • Confirme de antemano la adaptabilidad con el resto del equipo médico para utilizarlo juntos. • No lave el interior del catéter con solución salina esterilizada antes de cargar el embrión en el catéter. La solución salina esterilizada, si se deja en el catéter, puede causar problemas durante el proceso de aspiración embrionaria. • No levante a la fuerza ni vuelva a procesar. • Deséchelo inmediatamente después de su uso. Cualquier incidente grave (tal y como se define en el Reglamento Europeo de Productos Sanitarios, 2017/745) que se haya producido en relación con el producto debe notificarse a Kitazato Corporation y, si procede, a la autoridad competente del Estado miembro de la UE en el que esté establecido el usuario y/o paciente. **Nota:** Las instrucciones de uso están disponibles electrónicamente en Kitazato-ivf.com o bajo pedido.

FI- ET CATHETERS

YLEISTÄ TIETOA Perus UDI-DI: 458223146ETCHW Lue käyttöohjeet ennen käyttöä Kohderyhmä: Potilaat, joille tehdään hedelmöityshoitoja Vain ammattikäyttöön **KÄYTTÖTARKOITUS** Kitazato ET -katetri on tarkoitettu alkioiden ultraäänionhjattuun viemiseen kohtuonteloon in vitro -hedelmöityksen jälkeen **KÄYTTÖOHJEET** 1. Aseta potilas litotomia-asentoon. Aseta emättimen tähystin paljastaaksesi kohdunkaulan. Tarkista kohdunkaulan ja endometriumin tila ja päätä katetrin ja ohjaimen sisäänvientipituus ja kulma ennen käyttöä. **Varoitus:** käytä koettimen ohjainta, jos kohdunkaula taipuu ja vaikuttaa vaikealta ohittaa. 2. Pese vulva ja emätin steriloidulla suolaliuoksella ja kuivaa ne. 3. Liitä ruisku katetrin liittimeen ja aspiroi alkio katetriin mikroskoopin avulla. 4. Aseta katetri kohdunkaulaan. **Varoitus:** käytä apuna ohjainta tai koettimen ohjainta, jos katetri ei mene kohdunkaulan läpi itsestään. 5. Tarkista ultraäänen avulla, että katetri pääsi kohtuun. Paina hitaasti ruiskun mäntää ja poista alkio kohdunonteloon. 6. Poista katetri varovasti. 7. Tarkista alkioiden säilyminen. 8. Ota emättimen koetin ulos ja pidä potilas levossa. **VAROITUS: trauman seurauksena voi esiintyä verenvuotoa, joka johtuu katetrin asettamisesta kohdunkaulan läpi.** **TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT** • Steriilius: SAL 10-6 • LAL-määritys (endotoksiinit): < 20 EU/laite • Hiiren alkiomääritys (1-soluinen, % blastokysti 96 tunnin jälkeen): ≥ 80 % Käyttöturvallisuustiedote ja analyysitodistus ovat saatavilla pyynnöstä tai ne voidaan ladata verkkosivustoltamme (kitazato-ivf.com) **VARASTOINTIOHJEET** • Vältä säilytyksen yhteydessä korkeita lämpötiloja ja korkeaa ilmankosteutta. • Käytä heti avaamisen jälkeen. **VAROITUKSET** • Infektioiden välttämiseksi älä käytä uudelleen. • Älä steriloi uudelleen, jotta heikkeneminen vältetään. • Älä käyt

	STERILE | R	STERILE | EO	REF	LOT	MD		CE 2797	
EN	Sterilized using irradiation	Sterilized using Ethylene oxide gas	Catalog Number	Batch Code	Medical Device			Sterile barrier system
CZ	Sterilizováno pomocí záření	Sterilizováno pomocí ethylenoxidu	Katalogové číslo	Číslo šarže	Zdravotnický prostředek			Sterilní bariérový systém
SK	Sterilizované ožiarením	Sterilizované etylénoxidom	Katalógové číslo	Číslo šarže	Zdravotnícky prostriedok			Sterilný bariérový systém
DE	Sterilisiert mit Bestrahlung	Sterilisiert mit Ethylenoxidgas	Katalognummer	Chargencode	Medizinisches Gerät			Sterilbarrieresystem
PL	Sterylizowane metodą radiacyjną	Sterylizowane tlenkiem etylenu	Numer katalogowy	Kod partii	Wyrób medyczny			System bariery sterylnej
HU	Sterilizálás ionizálással	Sterilizálás etilén-oxiddal	Katalógusszám	Tétel kód	Egészségügyi eszköz			Sterilgát rendszer
ES	Esterilizado mediante irradiación	Esterilizado con gas óxido de etileno	Número de catálogo	Código de lote	Dispositivo médico			Sistema de barrera estéril
FR	Stérilisé par irradiation	Stérilisé par oxyde d'éthylène gazeux	Référence catalogue	Code de lot	Dispositif médical			Système de barrière stérile
GR	Αποστειρωμένο με χρήση ακτινοβολίας	Αποστειρωμένο με χρήση αιθυλενοξειδίου	Αριθμός καταλόγου	Κωδικός παρτίδας	Ιατροτεχνολογικό προϊόν			Αποστειρωμένο φραγμό συστήματος
HR	Sterilizirano ionizirajućim zračenjem	Sterilizirano etilen-oksidom	Kataloški broj	Oznaka serije	Medicinski proizvod			Sterilni barijerni sustav
IT	Sterilizzato mediante irradiazione	Sterilizzato con gas ossido di etilene	Numero di catalogo	Codice lotto	Dispositivo medico			Sistema di barriera sterile
LV	Sterilizēts ar apstarošanu	Sterilizēts ar etilēnoksīda gāzi	Kataloga numurs	Partijas kods	Medicīnas ierīce			Sterila barjersistēma
LT	Sterilizuota švitinimu	Sterilizuota etileno oksido dujomis	Katalogo numeris	Partijos kodas	Medicinos prietaisas			Sterilios barjerinės sistemos
NL	Gesteriliseerd met bestraling	Gesteriliseerd met ethyleenoxidegas	Catalogusnummer	Partij code	Medisch hulpmiddel			Steril barrièresysteem
PT	Esterilizado por irradiação	Esterilizado com gás óxido de etileno	Número de catálogo	Código do lote	Dispositivo médico			Sistema de barreira estéril
RO	Sterilizat prin iradiere	Sterilizat cu gaz oxid de etilenă	Număr de catalog	Număr de lot	Dispozitiv medical			Sistem de bariere sterilă
SE	Sterilt med strålning	Sterilt med etylenoxidgas	Katalognummer	Batchkod	Medicinteknisk produkt			Sterilt barriärsystem
RU	Стерилизовано облучением	Стерилизовано этиленоксидом	Каталожный номер	Код партии	Медицинское изделие			Стерильная барьерная система
SK	Sterilizované ožiarením	Sterilizované etylénoxidom	Katalógové číslo	Číslo šarže	Zdravotnícka pomôcka			Sterilný bariérový systém
UA	Стерилізовано за допомогою опромінення	Стерилізовано за допомогою газу оксиду етилену	Каталожний номер	Код партії	Медичний виріб			Стерильна бар'єрна система
TR	Iyonlama kullanılarak sterilize edilmiştir	Etilen oksit gazı kullanılarak sterilize edilmiştir	Katalog Numarası	Lot Kodu	Tıbbi cihaz			Steril bariyer sistemi
UA	Стерилізація за допомогою опромінення	Стерилізовано за допомогою газу оксиду етилену	Каталожний номер	Код партії	Медичний виріб			Стерильна бар'єрна система

tive ambientali federali, statali e locali quando si smaltisce il prodotto. • L'utente è responsabile di eventuali problemi causati da un uso improprio delle presenti istruzioni per l'uso. **PRECAUZIONI** • Verificare le specifiche (calibro e lunghezza) del catetere prima di aprire la custodia. • Confermare in anticipo l'adattabilità con le altre apparecchiature mediche da usare insieme. • Non lavare l'interno del catetere con soluzione salina sterilizzata prima d'infondere il catetere. Può causare problemi d'aspirazione. • Non forzare il recupero e non ripetere la procedura . • Gettare immediatamente dopo l'uso. Qualsiasi incidente grave (come definito nel Regolamento europeo sui dispositivi medici, 2017/745) verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato a Kitazato Corporation e, se applicabile, all'autorità competente dello Stato membro dell'UE in cui è stabilito l'utente e/o la paziente. **Nota:** le istruzioni per l'uso sono disponibili in formato elettronico su Kitazato-ivf.com o su richiesta.

LT- ET CATHETERS

BENDRA INFORMACIJA Bazinis UDI-DI: 458223146ETCHW Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukcijas Tikslinė populiacija: Pacientai, kuriems atliekamos dirbtinio apvaisinimo procedūros Tik profesionaliam naudojimui **NUMATOMA PASKIRTIS** Kitazato ET kateteris skirtas ultragarsu valdomam embrionų įvedimui į gimdos ertmę po apvaisinimo in vitro **NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS** 1. Padėkite pacientą į litotomijos padėtį. Įdėkite makšties skėtikį, kad atidarytumėt gimdos kaklelį. Patikrinkite gimdos kaklelio ir endometriumo būklę ir prieš naudojimą nuspręskite kateterio ir kreiptuvo įterpimo ilgį ir kampą. **Atsargiai:** naudokite stiletą, jei gimdos kaklelis lenkiasi ir atrodo sunku praeiti. 2. Nuplaukite vulvą ir makšį sterilizuotu druskos tirpalu ir išdžiovinkite. 3. Prijunkite švirkštą prie kateterio jungties ir įtraukite embrioną į kateterį mikroskopo kontrolėje. 4. Įdėkite kateterį iki gimdos kaklelio. **Atsargiai:** naudokite pravedėją arba stiletą kaip pagalbą, kai kateteris pats nepraeina per gimdos kaklelį. 5. Ultragarsu patikrinkite ar kateteris pasiekė gimdą. Letai paspauskite švirkšto stūmoklį ir ištumkite embrioną į gimdos ertmę. 6. Atsargiai ištraukite kateterį. 7. Patikrinkite, ar nėra embrionų sulaikymo. 8. Išimkite makšties skėtikį ir laikykite pacientą ramybėje. **ATSARGIAI: Kraujavimas gali atsirasti dėl traumos dėl kateterio įterpimo per gimdos kaklelį. PRODUKTO SPECIFIKACIJOS** • Sterilumas: SAL 10-6 • LAL tyrimas (endotoksinai): < 20 EU/prietaisas • MEA (1 ląstelių, % blastocisty po 96 val.): ≥ 80 % MSDS ir analizės sertifikatą galima gauti pateikus prašymą arba atsisiųsti iš mūsų svetainės (kitazato-ivf.com) **SAUGOJIMO ĮSIBROVIMAI** • Laikyti atokiau nuo aukštos temperatūros ir didelės drėgmės. • Po atidarymo naudokite nedelsiant. **ĮSPĖJIMAI** • Kad išvengtumėte infekcijos, nenaudokite pakartotinai. • Negalima pakartotinai sterilizuoti, kad išvengtumėte gedimo. • Nenaudokite produkto pasibaigus tinkamumo laikui. • Nenaudokite, jei pakuotė atidaryta ar pažeista. • Šis produktas skirtas naudoti medicinos specialistams, turintiems vaisingumo gydymo kvalifikaciją. • Reikia laikytis aseptikos reikalavimų. • Išmesdami produktą, laikykitės visų federalinių, valstijų ir vietinių aplinkosaugos taisyklių. • Vartotojas yra atsakingas už visas problemas, kilusias dėl neteisingo šio naudojimo instrukcijos. **ATSARGUMO PRIEMONĖS** • Prieš atidarydami maišelį, patvirtinkite kateterio specifikaciją (gabaritą ir ilgį) • Patvirtinkite pritaikomumą su kita medicinine įranga, kurią ketinate naudoti kartu. • Prieš užlašinadami kateterį, neplaukite kateterio vidaus sterilizuotu druskos tirpalu. Tai gali sukelti aspiracijos problemų. • Nekelkite per prievartą ir neperdirbkite. • Panaudoję nedelsdami išmeskite. Apie bet kokį sunkių padarinių sukėlusį incidentą (kaip apibrėžta Europos medicinos prietaisų reglamente (2017/745), susijusį su priemone, turėtų būti pranešta bendrovei "Kitazato Corporation" ir, jei taikoma, ES valstybės narės, kurioje įsisteigęs naudotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai. **Pastaba:** naudojimo instrukcijos pateikiamos elektroniniu būdu Kitazato-ivf.com arba paprašius.

LV- ET CATHETERS

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA Pamata UDI-DI: 458223146ETCHW Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju Mērķa populācija: pacienti, kuriem tiek veiktas ART procedūras Tikai profesionālai lietošanai **PAREDZĒTAIS LIETOJUMS** Kitazato ET katetru izmanto, lai ievietotu spermu, olšūnu vai embriju dzemdes dobumā caur dzemdes kaklu, miometriju vai vēderkaulu **LIETOŠANAS INSTRUKCIJA** 1. Novietojiet pacientu litotomijas stāvoklī. Ievietojiet makstī speculum, lai atklātu dzemdes kaklu. Pirms lietošanas pārbaudiet dzemdes kakla un endometrija stāvokli un izlemiet ievietošanas garumu un katetra un vadotnes leņķi. **Uzmanību:** Izmantojiet stila rokasgrāmatu, ja dzemdes kakls saliecas un šķiet grūti iziet. 2. Nomazgājiet vulvu un maksts ar sterilizētu sāls šķīdumu un nosusiniet. 3. Pievienojiet šļirci katetra savienotājam un ieelpojiet embriju katetrā mikroskopā. 4. Ievietojiet katetru līdz dzemdes kaklam. **Uzmanību:** Izmantojiet ceļvedi vai stila rokasgrāmatu kā palīdzību, ja katetrs pats neiziet cauri dzemdes kaklam. 5. Pārbaudiet, vai katetrs ultraskaņas laikā sasniedza dzemdi. Lēnām nospiediet šļirces virzuli un izspiediet embriju dzemdes dobumā. 6. Uzmanīgi noņemiet katetru. 7. Pārbaudiet embriju aizturi. 8. Izņemiet makstis speculum un turiet pacientu mierā. **UZMANĪBU: Asinošana var rasties traumas rezultātā, kas rodas, ievietojot katetru caur dzemdes kaklu. PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS** • Sterilitāte: SAL 10-6 • LAL noteikšana (endotoksīni): < 20 EU/ierīce • MEA (1 šūnu, % blastocistu pēc 96h): ≥ 80% MSDS un analīzes sertifikāts ir pieejami pēc pieprasījuma vai tos var lejupielādēt no mūsu tīmekļa vietnes (kitazato-ivf.com) **UZGLABĀŠANAS IELAUSĀNAS** • Uzglabāt prom no augstas temperatūras un augsta mitruma. • Lietojiet tūlīt pēc atvēršanas. **BRĪDINĀJUMI** • Lai izvairītos no infekcijas, nelietojiet atkārtoti. • Nesterilizējiet atkārtoti, lai izvairītos no paslīktināšanās. • Nelietojiet produktu pēc derīguma termiņa beigām. • Nelietojiet, ja iepakojums ir atvērts vai bojāts. • Šis produkts ir paredzēts lietošanai medicīnas speciālistiem, kas apmācīti auglības arstēšanā. • Jālieto aseptiska tehnika. • Izmetot produktu, ievērojiet visus federālos, štata un vietējos vides noteikumus. • Lietotājs ir atbildīgs par jebkādām problēmām, kas radušās šīs lietošanas instrukcijas nepareizas izmantošanas dēļ. **PIESARDZĪBAS PASĀKUMI** • Pirms maisiņa atvēršanas apstipriniet katetra specifikāciju (gabarītu un garumu) • Apstipriniet pielāgojamību ar citām medicīniskajām iekārtām, lai tās iepriekš lietotu kopā. • Pirms katetra ievadīšanas nemazgājiet katetra iekšpusi ar sterilizētu sāls šķīdumu. Tas var izraisīt aspirācijas problēmas. • Nevajag piespiedzēties piespiedu kārtā vai pārstrādāt. • Tūlīt pēc lietošanas iznīcina. Par jebkuru nopietnu negadījumu (kā definēts Eiropas Medicīnisko ierīču regulā (2017/745), kas noticis saistībā ar ierīci, būtu jāziņo Kitazato Corporation un attiecīgā gadījumā tās ES dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā lietotājs un/vai pacients veic uzņēmējdarbību. **Piezīme:** Lietošanas instrukcijas ir elektroniski pieejamas Kitazato-ivf.com vai pēc pieprasījuma.

NL- ET CATHETERS

ALGEMENE INFORMATIE Basis UDI-DI: 458223146ETCHW Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing Doelgroep: Patiënten die ART-procedures ondergaan Alleen voor professioneel gebruik **BEOOGD GEBRUIK** De Kitazato ET-katheter is bedoeld voor echogeleide inbreng van embryo's in de baarmoederholte na in-vitrofertilisatie **GEBRUIKSAANWIJZING** 1. Plaats de patiënt in de lithotomiepositie. Breng vaginaal speculum in om de baarmoederhals bloot te leggen. Controleer de toestand van de baarmoederhals en het baarmoederslijmvlies en bepaal voor gebruik de inbrenglengte en de hoek van de katheter en de geleider. **Let op:** Gebruik een stiletgeleider als de baarmoederhals buigt en moeilijk te passeren lijkt. 2. Was de vulva en de vagina met een gesteriliseerde zoutoplossing en droog ze af. 3. Sluit een spuit aan op de connector van de katheter en zuig het embryo onder de microscoop in de katheter. 4. Breng de katheter in tot aan de baarmoederhals. **Let op:** Gebruik een geleider of een stiletgeleider als hulpmiddel wanneer de katheter niet vanzelf door de baarmoederhals gaat. 5. Controleer of de katheter de baarmoeder heeft bereikt onder echografie. Druk langzaam op de zuiger van de spuit en verdrijf het embryo in de baarmoederholte. 6. Verwijder de katheter voorzichtig. 7. Controleer op retentie van embryo's. 8. Haal het vaginale speculum eruit en houd de patiënt in rust. **LET OP: Bloedingen kunnen optreden als gevolg van trauma als gevolg van het inbrengen van de katheter door de baarmoederhals. PRODUCT SPECIFICATIES** • Steriliteit: SAL 10-6 • LAL-test (endotoxinen): < 20 EU/apparaat • MEA (1-cel, % blastocysten na 96 uur): ≥ 80% MSDS en Certificate of Analysis zijn op aanvraag verkrijgbaar of kunnen worden gedownload van onze website (kitazato-ivf.com) **OPSLAG INSTRUCTIES** • Bewaar uit de buurt van hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid. • Direct na opening gebruiken. **WAARSCHUWINGEN** • Niet hergebruiken om infectie te voorkomen. • Niet opnieuw steriliseren om bederf te voorkomen. • Gebruik het product niet meer na de vervaldatum. • Niet gebruiken als de verpakking geopend of beschadigd is. • Dit product is bedoeld voor gebruik door medisch specialisten die zijn opgeleid in vruchtbaarheidsbehandelingen. • Er moet een aseptische techniek worden gebruikt. • Neem alle federale, staats- en lokale milieuvoorschriften in acht bij het weggooien van het product. • De gebruiker is verantwoordelijk voor eventuele problemen die worden veroorzaakt door onjuist gebruik van deze gebruiksaanwijzing. **VOORZORGSMAATREGELEN** • Bevestig de specificatie (dikte en lengte) van de katheter voordat u het opvangzakje opent • Bevestig vooraf het aanpassingsvermogen met de andere medische apparatuur om samen te gebruiken. • Was de binnenkant van de katheter niet met een gesteriliseerde zoutoplossing voordat u de katheter indient. Het kan aspiratieproblemen veroorzaken. • Niet met kracht buigen of opnieuw verwerken. • Gooi onmiddellijk na gebruik weg. Elk ernstig incident (zoals gedefinieerd in de Europese verordening betreffende medische hulpmiddelen, 2017/745) dat zich heeft voorgedaan met betrekking tot het hulpmiddel, moet worden gemeld aan Kitazato Corporation en, indien van toepassing, aan de bevoegde autoriteit van de EU-lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd. **Opmerking:** Gebruiksaanwijzingen zijn elektronisch beschikbaar op Kitazato-ivf.com of op aanvraag.

NO- ET CATHETERS

GENERELL INFORMASJON Grunnleggende UDI-DI: 458223146ETCHW Les bruksanvisningen før bruk Målgruppe: Pasienter som gjennomgår ART-prosedyrer Kun for profesjonell bruk **TILTENKT BRUK** Kitazato ET-kateteret er beregnet for ultralydveiledet innføring av embryoer i livmorhulen etter in vitro-fertilisering **BRUKSANVISNING** 1. Legg pasienten i litotomistilling. Før inn vaginal spekulum slik at livmorhalsen eksponeres. Kontroller livmorhalsens og endometriumets tilstand og bestem innføringslengden og vinkelen på kateteret og føringen før bruk. **Forsiktig:** Bruk en sondeleder hvis livmorhalsen bøyer seg og virker vanskelig å passere. 2. Rengjør vulva og skjeden med sterilisert saltoppløsning og tørk dem. 3. Sett en sprøyte i tilkoblingspunktet på kateteret og en aspiratembryo inn i kateteret under mikroskop. 4. Før kateteret inn i livmorhalsen. **Forsiktig:** Bruk en leder eller en sondeleder som hjelp hvis kateteret ikke går gjennom livmorhalsen av seg selv. 5. Sjekk at kateteret nådde livmoren ved hjelp av ultralyd. Trykk sakte på sprøytens stempel og støt embryoet ut i livmorhulen. 6. Fjern kateteret forsiktig. 7. Sjekk at embryoene blir værende. 8. Ta vaginalspekulumet ut og hold pasienten i ro. **FORSIKTIG: Det kan oppstå blødning som følge av traumer når kateteret føres inn gjennom livmorhalsen. PRODUKTSPESIFIKASJONER** • Sterilitet: SAL 10-6 • LAL-analyse (endotoksiner): < 20 EU/enhet • MEA (1-celle, % blastocyster etter 96 timer): ≥ 80 % MSDS og analysesertifikat kan fås ved forespørsel eller lastes ned fra nettstedet vårt (kitazato-ivf.com) **OPPBEVARINGSANVISNINGER** • Oppbevares unna høy temperatur og høy luftfuktighet. • Skal brukes umiddelbart etter åpning. **ADVARSLER** • For å unngå infeksjon må produktet ikke gjenbrukes. • For å unngå å forringe produktet må det ikke steriliseres. • Ikke bruk produktet etter utløpsdatoen. • Må ikke brukes hvis pakken er åpnet eller skadet. • Dette produktet er ment å brukes av medisinske spesialister med opplæring i fertilitetsbehandling. • Aseptisk teknikk skal benyttes. • Overhold alle føderale, statlige og lokale miljøforskrifter ved avhending av produktet. • Brukeren skal være ansvarlig for eventuelle problemer forårsaket av feilbruk av denne bruksanvisningen. **FORHOLDSREGLER** • Bekreft kateterets spesifikasjoner (mål og lengde) før posen åpnes • Bekreft på forhånd kompatibilitet med annet medisinsk utstyr som skal brukes sammen. • Ikke skyll innsiden av kateteret med sterilisert saltoppløsning før kateteret infuseres, da det kan føre til aspirasjonsproblemer. • Ikke bøy opp med tvang eller gjenbehandle. • Kastes umiddelbart etter bruk. Alle alvorlige hendelser (som definert i EU-forskriften om medisinsk utstyr , 2017/745) som har skjedd i forbindelse med enheten, skal rapporteres til Kitazato Corporation og, hvis aktuelt, den kompetente myndigheten i EU-medlemslandet der brukeren og/eller pasienten holder til. **Merk:** Bruksanvisningen er elektronisk tilgjengelig på Kitazato-ivf.com eller på forespørsel.

PL- ET CATHETERS

INFORMACJE OGÓLNE Podstawowy kod UDI-DI: 458223146ETCHW Przeczytaj instrukcję użytkowania przed użyciem Grupa docelowa: Pacjenci poddawani zabiegom ART Tylko do użytku profesjonalnego **PRZEZNACZENIE** Kateter Kitazato ET jest przeznaczony do wprowadzania zarodków do jamy macicy pod kontrolą USG podczas zapłodnienia pozaustrojowego. **SPOSÓB STOSOWANIA** 1. Ułóż pacjenta w pozycji litotomijnej. Włóż wziernik dopochwowy, aby odsłonić szyjkę macicy. Sprawdź stan szyjki macicy i błony endometrium. Zdecyduj o odpowiednim kątcie oraz głębokości wprowadzania kateter oraz jego prowadnicy. **Uwaga:** Użyj metalowego sztyletu formującego w przypadku problematycznego kanału szyjki macicy. 2. Przemyj srom oraz pochwę za pomocą sterylnej soli fizjologicznej, a następnie osusz je. 3. Podłącz strzykawkę do złącza kateter a i pobierz zarodek do kateter a pod kontrolą mikroskopu. 4. Wprowadzić kateter do szyjki macicy. **Uwaga:** Jeśli kateter nie przechodzi przez szyjkę macicy, należy skorzystać dodatkowo z jego prowadnicy lub metalowego sztyletu do formowania prowadnicy. 5. Sprawdź, czy kateter został wprowadzony do jamy macicy pod kontrolą USG. Powoli nacisnąj tłok strzykawki i umieść zarodek w jamie macicy. 6. Ostrożnie wyjmij kateter. 7. Sprawdź pod mikroskopem, czy zarodek nie pozostał w kateterze. 8. Wyjmij wziernik dopochwowy i utrzymuj pacjentkę w stanie spoczynku. **UWAGA: Może wystąpić krwawienie w wyniku urazu spowodowanego wprowadzeniem cewnika przez szyjkę macicy. SPECYFIKACJA PRODUKTU** • Sterylność: SAL 10-6 • Test LAL (endotoksyny): < 20 EU/urządzenie • MEA (1-komórkowy, blastocysty po 96h): ≥ 80% Karta Charakterystyki i Certyfikat Analizy są dostępne na żądanie lub można je pobrać z naszej strony internetowej (kitazato-ivf.com) **INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA** • Przechowywać z dala od wysokiej temperatury i wysokiej wilgotności. • Zużyć natychmiast po otwarciu. **OSTRZEŻENIA** • Aby uniknąć infekcji, nie używać ponownie. • Aby uniknąć pogorszenia jakości, nie sterylizuj ponownie. • Nie używać produktu po upływie terminu ważności. • Nie używać jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone. • Ten produkt jest przeznaczony do stosowania przez lekarzy specjalistów przeszkolonych w leczeniu niepłodności. • Należy stosować technikę aseptyczną. • Podczas wyrzucania produktu należy przestrzegać wszystkich państwowych, wojewódzkich i lokalnych przepisów dotyczących ochrony środowiska. • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie problemy spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem niniejszej instrukcji obsługi. **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI** • Przed otwarciem sterylnego opakowania należy sprawdzić specyfikację (rozmiar i długość) kateter a. • Przed użyciem sprawdź, czy produkt jest kompatybilny z innym sprzętem medycznym, który będzie stosowany podczas procedury. • Nie płucz wnętrza katetera wysteryzlizowaną solą fizjologiczną przed pobraniem zarodka. Sterylna sól fizjologiczna, która pozostanie w cewniku może powodować problemy podczas procesu aspiracji zarodka. • Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas manipulacji kateterem oraz nie używaj go ponownie. • Wyrzucić natychmiast po użyciu. Każdy poważny incydent (zgodnie z definicją zawartą w europejskim rozporządzeniu w sprawie wyrobów medycznych 2017/745), który miał miejsce w związku z wyrobem, należy zgłaszać firmie Kitazato Corporation oraz w stosownych przypadkach, właściwemu organowi państwa członkowskiego UE, w którym użytkownik i/lub pacjent ma siedzibę. **Uwaga:** Instrukcje użytkowania są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Kitazato-ivf.com lub na żądanie.

PT- ET CATHETERS

INFORMAÇÕES GERAIS IUD-DI básica: 458223146ETCHW Leia as instruções de utilização antes de utilizar População-alvo: Doentes submetidos a procedimentos de RMA Apenas para uso profissional **UTILIZAÇÃO PREVISTA** O cateter Kitazato ET destina-se à introdução guiada por ultrassom de embriões na cavidade uterina após fertilização in vitro **INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO** 1. Coloque o paciente na posição de litotomia. Insira espéculo vaginal para expor o colo do útero. Verifique a condição do colo do útero e do endométrio e decida o comprimento de inserção e o ângulo do cateter e da guia antes de usar. **Cuidado:** Use um estilete se o colo do útero se dobrar e parecer difícil de passar. 2. Lave a vulva e a vagina com soro fisiológico esterilizado e seque-as. 3. Conecte uma seringa ao conector do cateter e aspirar embrião para dentro do cateter ao microscópio. 4. Insira o cateter até ao colo do útero. **Cuidado:** Use um guia ou um estilete como assistência quando o cateter não atravessa o colo do útero por si só. 5. Verifique se o cateter atingiu o útero sob ultrassom. Pressione lentamente o êmbolo da seringa e expulse o embrião para a cavidade uterina. 6. Retire cuidadosamente o cateter. 7. Verifique a retenção de embriões. 8. Retire o espéculo vaginal e mantenha a paciente em repouso. **CUIDADO: O sangramento pode ocorrer como resultado de trauma devido à inserção do cateter através do colo do útero. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO** • Esterilidade: SAL 10-6 • Ensaio LAL (Endotoxinas): < 20 EU/dispositivo • MEA (1 célula, % blastocistos após 96h): ≥ 80% FDSM e Certificado de Análise estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser baixados do nosso site (kitazato-ivf.com) **INTRUSÕES DE ARMAZENAMENTO** • Armazenar longe de temperaturas altas e alta concentração de humidade. • Utilizar imediatamente após a abertura. **ADVERTÊNCIAS** • Para evitar a infeção, não reutilize. • Não volte a esterilizar, para evitar a deterioração. • Não utilize o produto após o prazo de validade. • Não utilize se a embalagem estiver aberta ou danificada. • Este produto destina-se a ser utilizado por médicos especialistas treinados em tratamento de fertilidade. • Deve ser utilizada uma técnica asséptica. • Observe todas as regulamentações ambientais Europeias, Nacionais e locais ao descartar o produto. • O utilizador será responsável por quaisquer problemas causados pelo uso incorreto da presente IFU. **PRECAUÇÕES** • Confirme a especificação (calibre e comprimento) do cateter antes de abrir a bolsa. • Confirmar previamente a adaptabilidade com os outros equipamentos médicos para utilizar em conjunto. • Não lave o interior do cateter com soro fisiológico esterilizado antes de perfundir o cateter. Pode causar problemas de aspiração. • Não levante à força nem reprocesse. • Rejeitar imediatamente após a utilização. Qualquer incidente grave (conforme definido no Regulamento Europeu relativo aos Dispositivos Médicos, 2017/745) que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado à Kitazato Corporation e, se aplicável, à autoridade competente do Estado-Membro da UE em que o utilizador e/ou doente está estabelecido. **Nota:** As instruções de utilização estão disponíveis eletronicamente em Kitazato-ivf.com ou mediante pedido.

RO- ET CATHETERS

INFORMAȚII GENERALE UDI-DI de bază: 458223146ETCHW Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de utilizare Grup țintă: Pacienți în curs de efectuare a procedurilor RUA Numai pentru uz profesional **UTILIZAREA PREVĂZUTĂ** Cateterul Kitazato ET este destinat introducerii ghidate cu ajutorul ecografului a embrionilor în cavitatea uterină în urma fertilizării in vitro **INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE** 1. Așezați pacientul în poziția litotomie. Introduceți speculul vaginal pentru a expune colul uterin. Verificați starea colului uterin și a endometrului și decideți lungimea de inserție și unghiul cateterului și ghidajului înainte de utilizare. **Atenție:** Utilizați un ghidaj cu stilet, dacă colul uterin se îndoaie și pare dificil de trecut. 2. Spălați vulva și vaginul cu soluție salină sterilizată și uscați-le. 3. Conectați o seringă la conectorul cateterului și aspirați embrionul în cateter sub microscop. 4. Introduceți cateterul până la colul uterin. **Atenție:** Utilizați un ghidaj sau un ghidaj cu stilet ca asistență atunci când cateterul nu trece singur prin colul uterin. 5. Verificați dacă cateterul a ajuns la uter sub ghidaj ecografic. Apăsați încet pistonul seringii și introduceți embrionul în cavitatea uterină. 6. Scoateți cu grijă cateterul. 7. Verificați dacă există retenție de embrioni. 8. Scoateți speculul vaginal și mențineți pacienta în repaus. **ATENȚIE: Sângerarea poate apărea ca urmare a traumatismului cauzat de introducerea cateterului prin colul uterin. SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI** • Sterilitate: SAL 10-6 • Testul LAL (endotoxine): < 20 EU/dispozitiv • MEA (1 celulă, % blastocisti după 96 de ore): ≥ 80% FTS și certificatul de analiză sunt disponibile la cerere sau pot fi descărcate de pe site-ul nostru (kitazato-ivf.com) **INSTRUCȚIUNI DE DEPOZITARE** • A se păstra departe de temperaturi ridicate și umiditate ridicată. • A se utiliza imediat după deschidere. **AVERTISMENTE** • Pentru a evita infecția, nu reutilizați. • Nu re-sterilizați, pentru a evita deteriorarea. • Nu utilizați produsul după data de expirare. • A nu se utiliza dacă ambalajul este deschis sau deteriorat. • Acest produs este destinat utilizării de către specialiști medicali instruiți în tratamentul infertilității. • Trebuie utilizată tehnica aseptică. • Respectați toate reglementările federale, de stat și locale de mediu atunci când aruncați produsul. • Utilizatorul este responsabil pentru orice probleme cauzate de utilizarea incorectă a prezentei IDU. **PRECAUȚII** • Confirmați specificațiile (diametrul și lungimea) cateterului înainte de a deschide punga • Confirmați compatibilitatea cu celelalte echipamente medicale pentru a le utiliza împreună în prealabil. • Nu spălați interiorul cateterului cu soluție salină sterilizată înainte de a perfuza cateterul. Poate provoca probleme de aspirație. • Nu ridicați forțat și nu reprocesați. • A se arunca imediat după utilizare. Orice incident grav (astfel cum este definit în Regulamentul european privind dispozitivele medicale, 2017/745) care a avut loc în legătură cu dispozitivul trebuie raportat către Kitazato Corporation și, dacă este cazul, către autoritatea competentă a statului membru al UE în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul. **Notă:** Instrucțiunile de utilizare sunt disponibile în format electronic la Kitazato-ivf.com sau la cerere.

RU- ET CATHETERS

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Базовый UDI-DI: 458223146ETCHW Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по применению Целевая группа: пациенты, проходящие процедуры ВРТ Только для профессионального использования **НАЗНАЧЕНИЕ** Катетер Kitazato ET предназначен для введения эмбрионов в полость матки под контролем УЗИ после процедуры экстракорпорального оплодотворения **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ** 1. Расположите пациента в положении для литотомии. Вставьте влагалищное зеркало, чтобы обнажить шейку матки. Перед использованием проверьте состояние шейки матки и эндометрия, а также определите глубину введения и угол катетера и проводника. **Внимание:** Используйте стилет, если шейка матки изгибается и кажется труднопроходимой. 2. Промойте вульву и влагалище стерилизованным физиологическим раствором и высушите их. 3. Подсоедините шприц к коннектору катетера и аспирируйте эмбрион в катетер под микроскопом. 4. Введите катетер через шейку матки. **Внимание:** Используйте проводник или стилет в качестве помощи, когда катетер не проходит через шейку матки самостоятельно. 5. Проверьте, что катетер достиг матки под контролем УЗИ. Медленно нажмите на поршень шприца и введите эмбрион в матку. 6. Осторожно извлеките катетер. 7. Убедитесь в том, что эмбрионы не остались в катетере. 8. Выньте влагалищное зеркало и оставьте пациентку в состоянии покоя. **ВНИМАНИЕ: В результате травмы из-за введения катетера через шейку матки может возникнуть кровотечение. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** • Стерильность: SAL 10-6 • Анализ LAL (эндотоксины): < 20 EU/изделие • МЕА-тест (1-клеточный, % бластоцист через 96 ч): ≥ 80% Паспорт безопасности и сертификат анализа доступны по запросу или могут быть загружены с нашего веб-сайта (kitazato-ivf.com) **ИНСТРУКЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ** • Хранить вдали от высокой температуры и высокой влажности. • Используйте сразу после вскрытия. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ** • Во избежание инфицирования не используйте повторно. • Не стерилизуйте повторно во избежание порчи. • Не используйте продукт по истечении срока годности. • Не используйте, если упаковка вскрыта или повреждена. • Этот продукт предназначен для использования медицинскими специалистами, прошедшими подготовку в области лечения бесплодия. • Следует использовать асептическую технику. • Соблюдайте все федеральные, государственные и местные экологические нормы при утилизации продукта. • Пользователь несет ответственность за любые проблемы, вызванные несоблюдением положений настоящей инструкции по применению. **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ** • Перед вскрытием упаковки проверьте технические характеристики (диаметр и длину) катетера. • Заранее убедитесь в совместимости с другим медицинским оборудованием для совместного использования. • Не промывайте внутреннюю часть катетера стерилизованным физиологическим раствором перед загрузкой катетера. Это может вызвать проблемы в процессе аспирации эмбриона. • Обращайтесь с осторожностью и не подвергайте повторной обработке. • Утилизируйте сразу после использования. О любом серьезном инциденте (как определено в Европейском регламенте по медицинскому оборудованию, 2017/745), произошедшем в отношении изделия, следует сообщать в Kitazato Corporation и, если применимо, в компетентный орган государства-члена ЕС, в котором зарегистрирован пользователь и/или пациент. **Примечание:** Инструкции по применению доступны в электронном виде на Kitazato-ivf.com или по запросу.

SE- ET CATHETERS

ALLMÄN INFORMATION Grundläggande UDI-DI: 458223146ETCHW Läs bruksanvisningen före användning Målgrupp: Patienter som genomgår ART-proceduror Endast för professionellt bruk **AVSEDD ANVÄNDNING** Kitazato ET-katetern är avsedd för ultraljudsstyrd introduktion av embryon i livmoderhalan efter provrörsbefruktning **BRUKSANVISNING** 1. Placera patienten i litotomiposition. Sätt in vaginalt spekulum för att exponera livmoderhalsen. Kontrollera tillståndet för livmoderhalsen och livmoderslemhinnan och bestäm införingslängden och vinkeln på katetern och guiden före användning. **Varning:** Använd en stilettguide om livmoderhalsen böjer sig och verkar svår att passera. 2. Tvätta vulvan och slidan med steriliserad koksaltlösning och torka dem. 3. Anslut en spruta till kateterns anslutning och aspirera embryot in i kateter n under mikroskop. 4. För in kateter n upp till livmoderhalsen. **Varning:** Använd en guide eller en stilettguide som hjälp när katetern inte går igenom livmoderhalsen av sig själv. 5. Kontrollera att katetern nått livmodern under ultraljud. Tryck långsamt på sprutkolven och tryck ut embryot i livmoderhålan. 6. Ta försiktigt bort katetern. 7. Kontrollera om embryon finns kvar. 8. Ta ut vaginalspekulumet och håll patienten i vila. **VARNING: Blödning kan uppstå till följd av trauma på grund av införande av katetern genom livmoderhalsen. SPECIFIKATIONER** • Sterilitet: SAL 10-6 • LAL-analys (endotoxiner): < 20 EU/enhet • MEA (1-cells, % blastocyster efter 96 timmar): ≥ 80 % Säkerhetsdatablad och analyscertifikat finns tillgängliga på begäran eller kan laddas ner från vår webbplats (kitazato-ivf.com) **FÖRVARINGSINSTRUKTIONER** • Förvaras åtskilt från hög temperatur och hög luftfuktighet. • Använd omedelbart efter öppnandet. **VARNINGAR** • För att undvika infektion, återanvänd inte. • Sterilisera inte på nytt för att undv