# KITAZATO®

Copyright © KITAZATO CORPORATION
All Rights Reserved.
V4 2024-01

CE 2797

# SEPASPERM WASH

Cell culture medium for washing and handling of human spermatozoa


**Kitazato Corporation**
100-10 Yanagishima, Fuji,
Shizuoka 416-0932 Japan
TEL: +81-545-65-7122 · FAX: +81-545-65-7128

EC REP **Dibimed - Biomedical Supply, S.L.**
C/Jorge Comin, 3 Valencia, 46015, Spain
Tel (+34) 963 056 395 Fax (+34) 963 056 396


| BASIC UDI-DI | 458223146GBDGL | | |
|---|---|---|---|
| **Product name** | **Product code** | **Reference number** | **Volume** |
| **SepaSperm Wash** (with gentamicin and human albumin) | SEDWSG-20 | 95730 | 20 ml |
| | SEDWSG-50 | 95731 | 50 ml |
| | SEDWSG-100 | 95732 | 100 ml |
| | SEDWSG-250 | 95733 | 250 ml |

Rx only
Prescription used only. US Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician or practitioner

**EN-SEPASPERM WASH**

**GENERAL INFORMATION** For professional use only. Target population: patients undergoing ART procedures. **Intended use** SepaSperm Wash is a medium intended for washing or swim-up of human spermatozoa and ICSI, IUI procedures. **Composition:** All references contain: • HEPES buffer • Bicarbonate • Physiologic salts • Glucose • Lactate • Human Serum Albumin (4.0 g/l) • Gentamicin (10 mg/l) **Instructions for use;** SepaSperm Wash is a ready-to-use medium. Warm solution at 37°C with closed lid. The detailed usage of SepaSperm Wash is determined based on each laboratory's procedure and protocols that are optimized for individual medical purposes. SepaSperm Wash Media must be prepared under laminar flow conditions (LAF bench ISO class 5 or sterile enclosure) in the presence of the recipient). **Washing of spermatozoa (suggested procedure)** The washing of spermatozoa can be done at room temperature or at 37°C. 1. Add 5ml SepaSperm Wash to the native semen sample and mix. Centrifuge for 10 minutes at approximately 300g. 2. Remove the supernatant and leave about 0.5ml of sperm in the centrifuge tube. 3. Add 5ml SepaSperm Wash to the test tube. Mix the solution gently until the pellet is completely dissolved. 4. Centrifuge again for 10 minutes at 300g. 5. Resuspend in a suitable volume of SepaSperm Wash or continue with a swim-up procedure. **Swim-up procedure (according to WHO, 2021)** 1. Gently layer 1.5ml SepaSperm Wash over 1ml of washed semen in a conical based centrifuge tube. 2. Incline the tube at an angle of 45° and incubate for 60 minutes at 37°C. 3. Gently turn to the upright position and remove the supernatant 1ml. 4. Dilute the aliquot of motile cells with 8 volumes SepaSperm Wash. Centrifuge for 15 minutes at 300g, remove supernatant and finally resuspend in 0.5ml of SepaSperm Wash Depending on the number of the daily procedures that will be performed is recommended separating the required volume of medium under laminar flow conditions (LAF bench ISO class 5 or sterile enclosure), repeated openings / warming cycles of the medium are avoided. Discard excess (un-used) media. Media are suitable to use in ambient atmosphere. **NOTE:** The cap of the bottle should be kept tightly closed during storage and use. **Storage conditions:** Store at 2-8°C. Use by date is stated which does not require the use of a CO2 incubator. **Product specifications** • pH: 7.30-7.60 (Release criteria) • Osmolality: 270-290 mOsm/kg • Sterility: SAL 10-3 • LAL assay (Endotoxins): < 0,25 EU/ml • 1-cell MEA (blastocysts after 96h) ≥ 80% after 1 hour of exposure (yolk stage) • Human albumin (HSA) ≥ 90% • Gentamicin (Ph Eur / USP) grade products if applicable MSDS and Certificate of Analysis which is available upon request or can be downloaded from our website (kitazato-ivf.com) **Storage instructions and stability:** • Store SepaSperm Wash between 2-8°C. • Do not freeze the product. • Do not use after the expiration date. • Do not use if packing is damaged or broken. • Do not use if media volume is less than 90% (shows evidence of evaporation). **Precautions:** • Product should not be used on a patient that has known allergy to gentamicin or similar antibiotics. • Aseptic technique should be used • Use sterilized equipment and materials only. • In case of eye or skin contact with SepaSperm Wash, immediately flush eyes or skin with water. • Observe local, state and federal environmental regulations when discarding the product. • The user shall be responsible for any problems caused by incorrect use of the present IFU. • This product is intended to be used by medical specialists trained in fertility treatment. • Any serious incident that occurs in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established. **Summary of safety and clinical performance (SSCP)** Performance characteristics of SepaSperm Wash are on SSCP available on EUDAMED website https://ec.europa.eu/tools/eudamed or under website kitazato-ivf.com. Note: Instructions for use are electronically available at Kitazato-ivf.com or upon request.

**BG-SEPASPERM WASH**

**ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ** Само за професионална употреба Целева популация: Пациенти, подложени на АРТ процедури **Предназначение** SepaSperm Wash е среда, предназначена за измиване или swim-up селектиране на човешки сперматозоиди и ICSI, IUI процедури **Състав:** Всички препарати съдържат: • HEPES буфер • Бикарбонат • Физиологични соли • Глюкоза • Лактат • Човешки серумен албумин (4,0 g/l) • Гентамицин (10 mg/l) **Инструкции за употреба:** SepaSperm Wash е готов за употреба. Загрейте разтвора при 37°C със затворен капак. Подробното използване на SepaSperm Wash се определя въз основа на процедурата и протоколите на всяка лаборатория, които са оптимизирани за индивидуални медицински цели. SepaSperm Wash Media трябва да се приготви при стерилни условия (LAF бенч ISO клас 5 или стерилен ръкавичен). **Измиване**

**CS-SEPASPERM WASH**

**OBECNÉ INFORMACE** Pouze pro profesionální použití.Cílová populace: Pacienti podstupující procedury ART **Zamýšlené použití** SepaSperm Wash je médium určené k mytí nebo vyplavování lidských spermií a procedurám ICSI, IUI. Složení: Všechny přípravky obsahují: • Vyrovnávací paměť HEPES • Hydrouhličitan • Fyziologické soli • Glukóza • Mléčnan • Albumin z lidském séru (4,0 g/l) • Gentamicin (10 mg/l) **Návod k použití:** SepaSperm Wash je médium připravené k použití. Teplý roztok na teplotu 37 °C otevřeným víčkem. Podrobné použití SepaSperm Wash se stanoveno na základě postupu a protokolů každé laboratoře, které jsou optimalizovány pro individuální lékařské účely. Promývací média SepaSperm musí být připravována za sterilních podmínek (LAF lavice ISO třída 5 a sterilní přístroj). **Myti spermií (doporučený postup)** 1. Přidejte 5 ml SepaSperm Wash do nativního vzorku spermatu a promíchejte. Odstřeďujte po dobu 15 minut při hmotnosti přibližně 300 g. 2. Odstraňte supernatant a ponechte asi 0,5 ml spermatu v odstředivé zkumavce. 3. Do zkumavky přidejte 5 ml SepaSperm Wash. Roztok jemně míchejte, dokud se peleta úplně nerozpustí. 4. Znovu odstřeďujte po dobu 10 minut při 300 g. 5. Resuspendujte ve vhodném objemu SepaSperm Wash nebo pokračujte v proceduře swim-up. **Postup Swim-up (podle WHO, 2010)** 1. Jemně navrstvěte 1,5 ml SepaSperm Wash přes 1 ml promytého ejakulátu v kuželové centrifugační zkumavce. 2. Nakloňte zkumavku pod úhlem 45° a inkubujte 60 minut při 37 °C. 3. Jemně otočte do vzpřímené polohy a vyjměte horní 1 ml. 4. Tento alikvot pohyblivých buněk zřeďte 8 objemy SepaSperm Wash. Odstřeďujte po dobu 15 minut při 300 g, odstraňte supernatant a nakonec resuspendujte v 0,5 ml SepaSperm Wash V závislosti na počtu denních procedur, které budou prováděny, se doporučuje oddělit požadovaný objem média za aseptických podmínek ve sterilním prostředí. Tuto činnost je možné provádět při pokojové teplotě nebo otevřením / uteplování média. Přebytečná (nepoužitá) média zlikvidujte. Média jsou vhodná pro použití v okolním prostředí. **POZNÁMKA:** Uzávěr láhve by měl být během předpřivarů pevně uzavřen. SepaSperm Wash je médium připravené k použití. Teplý roztok na teplotu 37 °C uvolněný. **Podmínky pro skladování a stabilita:** • Skladujte SepaSperm Wash při teplotě 2-8 °C • Chraňte před mrazem • Nepoužívejte po datu použitelnosti. • Nepoužívejte, pokud je obal poškozený nebo roztok je zakalený. • Po otevření je produkt stabilní po dobu nejméně 7 dnů v aseptických podmínkách a skladován při teplotě 2-8 °C. Po uplynutí této doby zbývající média zlikvidujte. • Výrobek je stabilní po max. 5 dnech od data výroby, pokud je skladován při teplotě 2-8 °C a chráněn před světlem. • Nepoužívejte, pokud je médium méně než 90% (vykazuje známky odpařování). **Varování:** • Nesterilizujte opakovaně. • Výrobek nezmrazujte. • Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. • Nepoužívejte, pokud je obal poškozený nebo roztoky • Nepoužívejte, pokud se roztok zakalí nebo se objeví částice. • Pro riziko infekce přenášené krví. **Opatření:** • Přípravek by neměl být používán u pacienta, u kterého je známa alergie na gentamicin nebo podobná antibiotika. • Měla by být použita aseptická technika • Používejte pouze sterilizované vybavení a materiály. • V případě kontaktu očí nebo kůže s SepaSperm Wash okamžitě vyplachněte oko/kůži vodou. • Při likvidaci produktu dodržujte všechny federální, státní a místní předpisy na ochranu životního prostředí. • Za případné problémy způsobené nesprávným použitím tohoto IFU odpovídá uživatel. • Tento produkt je určen k použití lékařskými specialisty

**DA-SEPASPERM WASH**

**GENEREL INFORMATION** Kun til professionel brug Målgruppe Patienter, der gennemgår ART-procedurer **DA: Tilsigtet anvendelse** SepaSperm Wash er et medium, der er beregnet til vask eller swim-up af humane spermatozoer og ICSI, IUI-procedurer. **Sammensætning:** Alle referencer indeholder: • HEPES-buffer • Bikarbonat • Fysiologiske salte • Glukose • Laktat • Humant serumalbumin (4,0 g/l) • Gentamicin (10 mg/l) **Brugervejledning:** SepaSperm Wash er et brugsklart medium. Opvarm opløsningen til 37°C med lukket låg. Den specifikke brug af SepaSperm Wash bestemmes ud fra hvert laboratoriums procedure og protokoller der er optimeret til individuelle medicinske formål. aseptiske aseptiske SepaSperm vaskemedier skal forberedes under sterile forhold (LAF bænk ISO-klasse 5 eller sterilt indelukke). **Vask af spermatozoer (foreslået procedure)** Vask af sperm kan ske ved stuetemperatur eller ved 37 °C. 1. Tilsæt 5 ml SepaSperm Wash til den oprindelige sædprøve og bland det. Centrifuger i 15 minutter ved ca. 300 g. 2. Fjern supernatanten og efterlad ca. 0,5 ml sperm i det centrifugerede. 3. Tilsæt 5 ml SepaSperm Wash til reagensglasset. Bland forsigtigt opløsningen indtil pelleten er helt opløst. 4. Centrifuger igen i 10 minutter ved 300 g. 5. Resuspender i en passende mængde SepaSperm Wash eller fortsæt med en swim-up procedure. **Swim-up procedure (ifølge WHO, 2021)** 1. Placer 1,5 ml SepaSperm Wash over 1 ml vaskede spermatozoer i et konisk centrifugerør. 2. Ret hætdes i en vinkel på 45° og inkuberes i 60 minutter ved 37°C. 3. Drej forsigtigt røret til lodret position og fjern de øverste 1 ml. 4. Fortynd prøven af motile celler med 8 volumen SepaSperm Wash. Centrifuger i 15 minutter ved 300 g, fjern supernatant og bland til sidst med 0,5 ml Se-paSperm Wash Afhængig af antallet af daglige procedurer der skal udføres anbefales det, at opbevare den nødvendige mængde medie under aseptiske forhold i en steril beholder. Med dette metode undgås gentagne åbninger / opvarmningscyklusser af mediet. Kassér den overskydende mængde (ubrugt) medier. Medier er egnede til brug i den omgivende atmosfære. **OBS:** Hætten på flasken skal holdes tæt lukket under for-opvarmning. SepaSperm Wash er et HEPES-buffret medium der ikke kræver brug af CO2-inkubator. **Produktspecifikationer** • Kemisk sammensætning • pH: 7,30-7,60 (frigivelseskriterier) • Osmolalitet: 270-290 mOsm/kg • Sterilisering: SAL 10-3 • LAL-assay (endotoksiner) < 0,25 EU/ml • 1-cellet MEA (blastocyster efter 96 timer) ≥ 80% efter 1 time eksponering (gyndestadie) • HSA (%motilitet nach 24h) ≥ 80% • Gentamicin (Ph. Eur- oder USP-Qualität, falls zutreffend • Sicherheitsdatenblatt und Analysezertifikat, der auf Anfrage erhältlich sind oder von unserer Website Terugtrekgelden kunnen worden Produkt Kitazato-ivf.com) **Lagerungsanvisninger og holdbarhed:** • Opbevar SepaSperm Wash mellem 2-8 °C. • Brug ikke produktet efter udløbsdatoen. • Brug ikke produktet, hvis emballagen er beskadiget eller åbnet. • Brug ikke produktet, hvis mængden af SepaSperm Wash er mindre end 90 % (viser tegn på fordampning). **Forholdsregler:** • Produktet bør ikke anvendes på en patient, der kendt allergi mod gentamicin eller lignende antibiotika. • Der bør anvendes aseptisk teknik • Brug kun steriliseret udstyr og materialer. • I tilfælde af øjen- eller hudkontakt med Gamete Buffer/SepaSperm Wash, skylles øjet/huden straks med vand. • Overhold alle føderale, statslige og lokale miljøbestemmelser, når du bortskaffer produktet. • Brugeren er ansvarlig for eventuelle problemer forårsaget af forkert brug af denne vejledning. • Dette produkt er beregnet til at blive brugt af medicinske specialister, der er uddannet i fertilitetsbehandling • Alle blodprodukter skal behandles som potentielt smittsomme materialer, hvorfra der altid er risiko for overførsel af patogener. • Enhver alvorlig hændelse i forbindelse med produktet bør indberettes til fabrikanten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten befinder sig. **Sammenfatning af sikkerhed og klinisk ydeevne (SSCP)** Ydeevnekegenskaber for Gamete Buffer / SepaSperm Wash er for SSCP tilgængelige på EUDAMED hjemmeside https://ec.europa.eu/tools/eudamed eller vores hjemmeside kitazato-ivf.com. Bemærk: Brugsanvisninger er elektronisk tilgængelige på Kitazato-ivf.com eller efter anmodning.

**EE-SEPASPERM WASH**

**ÜLDINE TEAVE** Ainult professionaalseks kasutamiseks Sihtrühm: ART-protseduure läbivad patsiendid **Kasutusala** SepaSperm Wash on meedium, mis on ette nähtud inimese spermatozoidide eesmiseks või ujumiseks ning ICSI, IUI protseduurideks. **Koostis:** • HEPES puhver • Vesinikkarbonaad • Füsioloogilised soolad • Glükoos • Laktaat • Inimese seerumi albumiin (4,0 g/l) • Gentamütsiin (10 mg/l) **Kasutusjuhend:** SepaSperm Wash on kasutusvalmis meedium. Soojendage lahust enne kasutamist 37 °C juures suletud kaanega. SepaSperm Wash üksikasjalik kasutamine määratakse kindlaks iga labori protseduuri ja protokollide põhjal, mis on optimeeritud individuaalsteks meditsiinilisteks eesmärkideks. SepaSperm Wash meedia tuleb valmistada steriilsetes tingimustes (LAF pink ISO klass 5 ja steriilne anum). **Spermatosoidide pesemine (soovitatav protseduur)** Spermatosoidide pesemine võib toimuda toatemperatuuril või 37 °C juures. 1. Lisage riativsele spermaproovile 5 ml SepaSperm Wash meedium ja segage. Tsentrifuugitakse 10 minutit umbes 300 x g juures. 2. Eemaldage supernatant ja jätke tsentrifuugi katseklaasi umbes 0,5 ml spermat. 3. Lisage katseklaasi 5 ml SepaSperm Wash meediumi, Segage lahust õrnalt, kuni pellet on täielikult lahustunud. 4. Tsentrifuugitakse uuesti 10 minutit 300 g juures. 5. Resuspendeerige sobivas koguses SepaSperm Wash meediumis või jätkake ujumisprotseduuriga **Swim-up protseduur (vastavalt WHO, 2021)** 1. Kihistage 1,5 ml SepaSperm Wash-i õrnalt 1 ml pestud spermale koonilises tsentrifuugi katsekaasis. 2. 60 minutiks inkubaatoris 37°C juures 60 minutit 45 kraadi nurga all. 3. Pöörake ettevaatlikult püstisasendisse ja eemaldage ülemine 1ml. 4. Lahjendage eemaldatud motiilsete rakkude alikvoot 8 mahuosa SepaSperm Wash meediumiga. Tsentrifuugige 15 minutit 300 g juures, eemaldage supernatant ja lõpuks resuspendeerige 0,5 ml SepaSperm Wash meediumis. Sõltuvalt igapäevaste protseduuride arvust on soovitatav eraldada vajalik kogus söödet aseptilistes tingimustes täiendavatesse steriilsetesse anumatesse. Selle strateegiaga saate vältida söötme korduvat avamist/soojendamist. Visake ära ükspuha. Kasutamata söötmed sobivad sobimasi kasutamiseks umbritsevas keskkonnas. **MÄRKUS:** Pudeli kork tuleb eelsoojendamise ajal hoida tihedalt suletuna. SepaSperm Wash on HEPES-puhverdatud meedium, mis ei nõua CO2 inkubaatori kasutamist. **Toote spetsifikatsioonid:** • pH: 7,30–7,60 (eraldumiskriteeriumid) • Osmolaalsus: 270-290 mOsm/kg • Sterilisatsioon: SAL10-3 • LAL analüüs (endotoksiinid): < 0,25 EU/ml • 1-rakuline MEA (blastotsüsti parast 96 tundi): ≥ 80% parast 1-tunnist kokkupuudet (kiigoodi staadium) • HSSA (%motoonika 24 tunnist parast): ≥ 80% • Ph Eur või USP kvaliteedis gentamütsiin, kui see on kohaldatav • Ohutusandmete leht ja analüüsisertifikaat, mis on saadaval nõudmisel või mida saab alla laadida meie veebisaidilt (kitazato-ivf.com) **Hoiustamisjuhised ja stabiilsus:** • Hoidke SepaSperm Wash vahemikus 2-8 ° C. • Hoida eemal päikesevalgusest. • Pärast avamist hoidke toodet originaalpakendis. • Ärge kasutage toodet pärast aegumiskuupäeva. • Ärge kasutage toodet, kui pudel on kahjustatud. • Ärge kasutage, kui toote mahu on vähem kui 90% (aurustumise tõttu). **Ettevaatusabinõud:** • Toodet ei tohi kasutada patsiendil, kellel on teadaolevalt allergia gentamütsiini või sarnaste antibiootikumide suhtes. • Kasutada tuleks aseptilist tehnikat • Kasutage ainult steriliseeritud seadmeid ja materjale . • Silma või naha sattumisel SepaSperm Washi tootjatega silmade või nahaga kokku puutumisel loputage kohe tõhusalt veega. • Järgige kõiki föderaalseid, osariigi ja kohalikke keskkonnaseeskirju. • Kasutaja vastutab käesoleva IFU ebaõigest kasutamisest tulenevate probleemide eest. • See toodab on ette nähtud kasutamiseks viljatusravi alal koolitatud meditsiinispetsialistide poolt. • Kõigist tootega seotud tõsistest juhtumitest peaks teatama tootjale ja pädevale riigi liikmesriigile, milles see toode sees on, asutus HIV-1/-2, HBV või HCV antikehade testimisel negatiivseks ja HbsAg suhtes mittereageerivaks, Teadaolevad katsemeefoolid ei taga, et inimverest saadud toodeid ei kanna nakkusetekitajaid edasi. • Standardmeetmed infektsioonide tõrjeks verepreparaatidest ravimisel hõlmavad patsientide tulenevate nakkuste võimalikeks hõlmavad tõhusaid tootmisetappe viiruste inaktiveerimiseks/eemaldamiseks. Inimveres või inimese vereplasmast valmistatud ravimite manustamisel ei saa täielikult välistada nakkushaiguste põhjustajate edastamise võimalust, seetõttu ka tundmatute või esilekerkivate viiruste ja muude patogeenide kohta. • Igast seadmega seotud tõsisest vahejuhtumist tuleks teatada tootjale ning kasutajal ja/või patsiendil asukohamälestusriigi pädevale asutusele. **Ohutuse ja kliinilise toimivuse kokkuvõte:** SepaSperm Wash tunnusomadused on SSCP-s kättesaadavad EUDAMED veebisaidil https://ec.europa.eu/tools/eudamed või meie veebisaidil kitazato-ivf.com. Märkus: Kasutusjuhend on elektroniliselt kättesaadav aadressil Kitazato-ivf.com või nõudmisel.

**ES-SEPASPERM WASH**

**INFORMACIÓN GENERAL** Solo para uso profesional Población objetivo: Pacientes sometidos a procedimientos de reproducción asistida **Uso previsto** SepaSperm Wash es un medio diseñado para el lavado o swim-up de espermatozoides humanos y procedimientos ICSI, IUI. **Composición:** Todas las referencias contienen: • Búfer HEPES • Bicarbonato • Sales fisiológicas • Glucosa • Lactato • Albúmina sérica humana (4,0 g/l) • Gentamicina (10 mg/l) **Instrucciones de uso** SepaSperm Wash es un medio listo para usar. Solución tibia a 37ºC con tapa cerrada. El uso detallado de SepaSperm Wash se determina en función del procedimiento y los protocolos de cada laboratorio que estan optimizados para fines médicos individuales. El medio SepaSperm Wash debe prepararse en condiciones estériles (banco LAF ISO clase 5 y recipiente estéril). **Lavado de espermatozoides (procedimiento sugerido)** El lavado de los espermatozoides se puede realizar a temperatura ambiente o a 37°C. • Añadir 5 ml de SepaSperm Wash a la muestra de esperma nativa y mezclar. Centrifugar durante 15 minutos a 300g aproximadamente. 2. Retire el sobrenadante y deje aproximadamente 0,5 ml de semen en el tubo de la centrifuga. 3. Añade 5 ml de SepaSperm Wash al tubo de ensayo. Mezcle la solución suavemente hasta que el gránulo se disuelva por completo. 4. Centrifugar de nuevo durante 10 minutos a 300g. 5. Vuelva a suspender en un volumen adecuado de SepaSperm Wash o continúe con un procedimiento de inmersión. **Procedimiento Swim-up (según OMS, 2021)** 1. Coloque suavemente 1,5 ml de SepaSperm Wash sobre 1 ml de semen lavado en un tubo de centrífuga de base cónica. 2. Incline el tubo en un ángulo de 45° e incube durante 60 minutos a 37°C. 3. Gire suavemente a la posición vertical y retire el 1 ml superior. 4. Diluir esta alícuota de células móviles con 8 volúmenes de SepaSperm Wash. Centrifugar durante 15 minutos a 300g, retirar el sobrenadante y finalmente resuspender en 0,5ml de SepaSperm Wash Dependiendo del número de procedimientos diarios que se vayan a realizar, se recomienda separar el volumen requerido de medio en condiciones asépticas en un recipiente estéril. Con esta estrategia, se evitan las aperturas / ciclos de calentamiento repetidos del medio. Deseche el exceso de medios (no utilizados). Los medios son adecuados para su uso en temperatura ambiente. **NOTA:** La tapa de la botella debe mantenerse bien cerrada durante el precalentamiento. SepaSperm Wash es un medio tamponado con HEPES que no requiere el uso de una incubadora de CO2. **Especificaciones del producto** • pH: 7,30-7,60 (Criterios de liberación) • Osmolalidad: 270-290 mOsm/kg • Esterilización: SAL10-3 • Ensayo LAL (endotoxinas): < 0,25 UE/ml • MEA de 1 célula (blastocistos después de 96 h): ≥ 80% después de 1 hora de exposición (etapa de yema) • Albúmina humana (HSA) ≥ 90% (ensayos de 24h): ≥ 80% • Uso de productos adecuados a requisitos Ph Eur (Farmacopea Europea) o USP (Farmacopea de Estados Unidos). si corresponde. MSDS y Certificado de Análisis que está disponible previa solicitud o se puede descargar desde nuestro sitio web (kitazato-ivf.com) Instrucciones de almacenamiento y estabilidad: • Almacenar SepaSperm Wash entre 2-8°C • Mantener alejado de la luz solar. • Una vez abierto, guarde el producto en el embalaje original. • Una vez abierto, el producto es estable durante al menos / días en condiciones asépticas y almacenado entre 2 y 8 °C. • No utilice el producto después de la fecha de vencimiento. • No lo use si el embalaje está dañado o roto. • No lo use si el producto se vuelve turbio o muestra evidencia de contaminación microbiana. **Precauciones:** • El producto no debe usarse en un paciente que tenga alergia conocida a la gentamicina o antibióticos similares. • Se debe utilizar una técnica aséptica • Utilice únicamente equipos y materiales esterilizados. • En caso de contacto con los ojos o la piel con Gamete Buffer/SepaSperm Wash, enjuague inmediatamente los ojos o la piel con agua. • Observe las normativas ambientales locales aplicables cuando deseche el producto. • El usuario será responsable de cualquier problema causado por un uso incorrecto o por no seguir las presentes instrucciones de uso. • Este producto está destinado a ser utilizado por especialistas médicos capacitados en tratamientos de fertilidad. • Todos los productos que incluyen derivados de la sangre deben tratarse como potencialmente infecciosos. El material de origen del que se derivó este producto resultó negativo cuando se realizó la prueba de anticuerpos contra el VIH-1/-2, el VHB o el VHC, y no reactivo para el HBsAg mediante pruebas de ácidos nucleicos (NAT) aprobadas por la FDA. Las pruebas no pueden garantizar que los productos derivados de la sangre humana no transmitan agentes infecciosos. • Las medidas normalizadas para prevenir las infecciones resultantes de la aplicación de productos sanguíneos humanos incluyen la selección de donantes humanos incluyen pasos de fabricación eficaces para la inactivación/eliminación de virus. Cuando se administran medicamentos preparados a partir de sangre o plasma humanos, no puede excluirse totalmente la posibilidad de transmisión de agentes infecciosos. Esto también se aplica a virus desconocidos o de reciente aparición y otros patógenos. • Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el producto debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del estado miembro en el que esté establecido el usuario o el paciente. **Resumen de seguridad y rendimiento clínico (SSCP)** Las características de funcionamiento de SepaSperm Wash están disponibles en SSCP en el sitio web de EUDAMED https://ec.europa.eu/tools/eudamed o en nuestro sitio web kitazato-ivf.com. Nota: Las instrucciones de uso están disponibles electrónicamente en https://Kitazato-ivf.com o bajo solicitud.

**FI-SEPASPERM WASH**

**YLEISTÄ TIETOA** Vain ammattikäyttöön Kohderyhmä: potilaat, joille tehdään hedelmöityshoitoja **Käyttötarkoitus** SepaSperm Wash on väliaine, joka on tarkoitettu ihmisen siittiöiden pesuun tai lajitteluun ja ICSI- tai IUI-toimenpiteisiin **Koostumus:** Kaikki tuotteet sisältävät seuraavia: • HEPES-puskuri • Bikarbonaatti • Fysiologiset suolat • Glukoosi • Laktaatti • Ihmisen seerumin albumiini (4,0 g/l) • Gentamysiini (10 mg/l) **Käyttöohjeet:** SepaSperm Wash on käyttövalmis väliaine. Lämmitä liuos 37 °C:een kanssi suljettua. SepaSperm Washin yksityiskohtainen käyttö määritetään kunkin laboratorion menettelyn ja protokollien perusteella, jotka on optimoitu yksittäisiin lääketieteellisiin tarkoituksiin. SepaSperm-pesuväliaine on valmistettava steriilissä olosuhteissa (LAF-penkki ISO-luokka 5 ja steriili astia). **Siittiöiden pesu (ehdotettu menettely)** Siittiöiden pesu voidaan suorittaa huoneenlämmössä tai 37 °C:ssa. 1. Lisää 5 ml SepaSperm Washia alkuperäiseen siemennesteenäytteeseen ja sekoita. Sentrifugoi 15 minuuttia noin 300 g:ssa. 2. Supernatanti poistetaan ja sentrifugointiputkeen jätetään noin 0,5 ml siemennestettä. 3. Lisää 5 ml SepaSperm Washia koeputkeen. Sekoita liuosta varovasti, kunnes pelletti on täysin liuennut. 4. Sentrifugoi uudelleen 10 minuutin ajan 300 g:ssa. 5. Sekoita uudelleen sopivaan määrään SepaSperm Washia tai jatka lajittelua. **Lajittelumenettely (WHO:n mukaan, 2021)** 1. Kerrosta 1,5 ml SepaSperm Washia varovasti 1 ml:n pesty siemennestemäärän päälle kartiomaisessa sentrifuugiputkessa. • Putki kallistetaan 45° kulmassa ja inkuboidaan 60 minuutin ajan 37°C:ssa. 3. Käännä varovasti pystyasentoon ja poista ylin 1 ml. 4. Laimenna tätä liikkuvien solujen määräosaa 8 tilavuusosalla SepaSperm Washia. Sentrifugoi 15 minuutin ajan 300 g:ssa, poista supernatanttiväliaine ja suspendoi lopuksi uudelleen 0,5 ml:aan SepaSperm Washia. Suoritettavien päivittäisten toimenpiteiden lukumäärästä riippuen on suositeltavaa erottaa tarvittava määrä valiainetta aseptisissa olosuhteissa steriilissä astiassa. Tällä strategialla vältetään väliaineen toistuvat avaamiset/lämmitysjaksot. Hävitä ylimääräinen (käyttämätön) väliaine. Väliaineet soveltuvat käytettäväksi ympäröivässä ympäristössä. **HUOMAUTUS:** Pullon korkki on pidettävä tiiviisti suljettuna esilämmityksen aikana. SepaSperm Wash on HEPES-puskuroitu väliaine, joka ei vaadi hiilidioksidi-inkubaattoria. **Tuotteen tiedot** • pH: 7,30–7,60 (vapautuskriteerit) • Osmolaliteetti: 270–290 mOsm/kg • Sterilointi: SAL 10-3 • LAL-määritys (endotoksiinit): < 0,25 EU/ml • 1-solunen hiiren alkiomääritys (alkiorakkulat 96 tunnin jälkeen) ≥ 80 % 1 tunnin altistuksen jälkeen (tsygoottivaihe) • HSSA (%liikkuvuus 24 tunnin jälkeen) ≥ 80 % • Ph Eur- tai USP-laatuinen gentamysiini, jos käyttö tarvittaessa • Käyttöturvallisuustiedote ja analyysitodistus, joka on saatavilla pyynnöstä tai ladattavissa verkkosivustoltamme (kitazato-ivf.com) **Varastointiohjeet ja stabiilisuus:** • Säilytä SepaSperm Washia 2–8 °C:ssa. • Suojaa valolta. • Älä käytä tuotetta viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. • Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut tai rikkoutunut. • Älä käytä, jos väliaineen määrä on alle 90 % (osoittaa haihtumista). **Varotoimet:** • Valmistetta ei saa antaa potilaalle, jonka tiedetään olevan allerginen gentamysiinille tai vastaaville antibiooteille. • Aseptista tekniikkaa tulee käyttää • Käytä vain steriilistyjä laitteita ja materiaaleja . • Jos SepaSperm Washia joutuu silmiin tai iholle, huuhtele silmät tai iho välittömästi vedellä. • Noudata kaikkia valtion ja paikallisia ympäristömääräyksiä, kun hävität tuotteen. • Käyttäjä on vastuussa ongelmista, jotka aiheutuvat virheellisestä käytöstä tai nykyisen käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä • Tämä tuote on tarkoitettu hedelmöityshoitoihin koulutettujen lääketieteen asiantuntijoiden käyttöön. • Kaikkia venivalmisteita on käsiteltävä mahdollisesti tartuntavaarallisina. Lähdemateriaali, josta tämä tuote on johdettu, todettiin negatiiviseksi, kun sitä testattiin HIV-1/-2, HBV- tai HCV-vasta-aineita, ja ei-reaktiiviseksi HBsAg:n suhteen. Tunnetuilla testimenetelmillä ei voida taata, että ihmisverestä johdetut tuotteet eivät vältä tartuntavaarallisia aineita. • Terveydenhuollon ammattilaisten tulisi noudattaa yleisiä varotoimia infektioiden ehkäisemiseksi siirrettäessä ihmisperäisiä aineita, jotta vältetään tartuntavaarallisten virusten siirtyminen mahdollisuutta ei voida sulkea pois kokonaan. Tämä koskee myös tuntemattomia tai uusia viruksia ja muita taudinaiheuttajia. • Kaikista laitteiseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, johon käyttäjä ja/tai potilas on sijoittautunut. **Tiivistelmä turvallisuudesta ja kliinisestä suorituskyvystä (SSCP)** SepaSperm Washin suorituskykyominaisuudet ovat turvallisuuden ja kliinisen suorituskyvyn yhteenveto, joka on saatavilla EUDAMEDin verkkosivustolla https://ec.europa.eu/tools/eudamed tai verkkosivustollamme kitazato-ivf.com. Huomautus: käyttöohjeet ovat sähköisesti saatavilla osoitteessa Kitazato-ivf.com tai pyynnöstä.

**FR-SEPASPERM WASH**

**INFORMATIONS GÉNÉRALES** Pour un usage professionnel uniquement Population cible : Patients subissant une procédure de TAR Utilisation conforme SepaSperm Wash est un milieu destiné au lavage ou à la remontée des spermatozoïdes humains et aux procédures ICSI, IUI. **Composition:** Toutes les références contiennent : • HEPES • Bicarbonate • Sels physiologiques • Glucose • Lactate • Albumine sérique humaine (4,0 g/l) • Gentamicine (10 mg/l) **Mode d'emploi** SepaSperm Wash est un milieu prêt à l'emploi. Solution tiède à 37°C avec couvercle fermé. L'utilisation détaillée de SepaSperm Wash est déterminée en fonction de la procédure et des protocoles de chaque laboratoire qui sont optimisés à des fins médicales individuelles. Le milieu SepaSperm Wash doit être préparé dans des conditions stériles (paillasse LAF classe ISO 5 et receveur stérile). **Lavage des spermatozoïdes (procédure suggérée)** Le lavage des spermatozoïdes peut se faire à température ambiante ou à 37°C. 1. Ajoutez 5 ml de SepaSperm Wash à l'échantillon de sperme natif et mélangez. Centrifuger pendant 15 minutes à environ 300g. 2. Retirez le surnageant et laissez environ 0,5 ml de sperme dans le tube à centrifuger. 3. Ajoutez 5 ml de SepaSperm Wash dans le tube à essai. Mélangez doucement la solution jusqu'à ce que la pastille soit complètement dissoute. 4. Centrifugez à nouveau pendant 10 minutes à 300g. 5. Remettre en suspension dans un volume approprié de SepaSperm Wash ou poursuivre avec une procédure de Swim-up. **Procédure Swim-up (selon l'OMS, 2021)** 1. Étalez délicatement 1,5 ml de SepaSperm Wash sur 1 ml de sperme lavé dans un tube à centrifuger à base conique. 2. Incliner le tube à un angle de 45° et incubez pendant 60 minutes à 37°C. 3. Tournez doucement en position verticale et retirez le 1 ml le plus haut. 4. Diluer cette aliquote de cellules mobiles avec 8 volumes de SepaSperm Wash. Centrifuger pendant 15 minutes à 300g, retirer le surnageant et enfin remettre en suspension dans 0,5 ml de SepaSperm Wash. En fonction du nombre d'interventions quotidiennes qui seront effectuées, il est recommandé de séparer le volume requis de milieu dans des conditions aseptiques dans un récipient stérile. Grâce à cette stratégie, les ouvertures / cycles de réchauffement répétés du milieu sont évités. Jetez les milieux excédentaires (non utilisés). Les médias peuvent être utilisés dans une atmosphère ambiante. **REMARQUE :** Le bouchon de la bouteille doit être maintenu hermétiquement fermé pendant le préchauffage. SepaSperm Wash est un milieu tamponné HEPES, qui ne nécessite pas l'utilisation d'un incubateur à CO2. **Caractéristiques du produit** • pH : 7,30 - 7,60 (critères de libération) • Osmolalité : 270-290 mOsm/kg • Stérilisation : SAL 10-3 • Test LAL (Endotoxines) : < 0,25 EU/ml • MEA à 1 cellule (blastocystes après 96h) : ≥ 80% après 1 heure d'exposition (stade vitellin) • Albumine humaine (HSA) : ≥ 90% • Utilisation de produits de qualité Ph Eur ou USP le cas échéant • Fiche signalétique et certificat d'analyse qui est disponible sur demande ou peut être téléchargé sur notre site Web (kitazato-ivf.com) **Instructions de stockage et stabilité** • Conservez SepaSperm Wash entre 2 et 8 °C. • Ne pas congeler le produit. • Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur la bouteille ou l'emballage n'est pas ouvert ou n'est pas endommagé. **Avertissements:** • Ne pas

| | | |